Meteorologisk institutt
met.no
KLIMA

ISSN 0808 -3681
Nr 6, 2003


Klimatologisk hurtigoversikt

Juni 2003

Nedbør

Utjevnet nedbørsum
i prosent av normal

- 0 - 25
- 25 - 50
- 50 - 75
- 75 - 100
- 100 - 125
- 125 - 150
- 150 - 175
- 175 - 200



Normalperioden er 1961 - 1990
Grafene viser døgnnedbør i millimeter

Utgitt: 01.07.2003


Ved bruk av kart, tekst og tall skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.

Klimatologisk hurtigoversikt

Juni 2003

Lufttemperatur

Utjevnet avvik i ° C fra normal månedstemperatur.



Normalperioden er 1961 - 1990

Grafene viser døgntemperatur og normal

Utgitt: 01.07.2003

Ved bruk av kart, tekst og tall skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.

Lufttemperatur og nedbør i juni 2003

Juni var varmere enn normalt i store deler av landet. Det kom betydelig mindre nedbør enn normalt i Nord-Norge og mer nedbør enn normalt på Vestlandet og på deler av Østlandet. Enkelte av værstasjonene på Østlandet satt ny månedsrekord for døgnnedbør.

Lufttemperatur

Månedstemperaturen for Norge er 0,6 °C *høyere* enn normalt. Månedstemperaturen på store deler av Vestlandet ble 1,5 - 2,0 °C *høyere* enn normalt. Størst positivt temperaturavvik hadde Hjelvik – Myrbø (MR) med 2,0 °C *høyere* lufttemperatur enn det normale for måneden.

De høyeste månedstemperaturene kom i områdene rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Oslo-Blindern (OS) var varmest med 16,3 °C (1,1 °C over normalen) etterfulgt av Sarpsborg (ØF) med 16,1 °C (1,5 °C over normalen). Bortsett fra i fjellet i Sør-Norge kom de laveste månedstemperaturene langs kysten av Finnmark, hvor Slettnes fyr (FI) hadde 5,2 °C (1,1 °C under normalen) mens både Vardø (FI) og Makkaur fyr (FI) hadde 5,5 °C (henholdsvis 0,7 °C og 1,2 °C under normalen).

Høyeste maksimumstemperatur kom på Nesbyen – Skoglund (BU) med 28,6 °C 27. juni. Geilo – Geilostølen (BU) hadde landets laveste minimumstemperatur –5,0 °C 1. juni.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene er månedsnedbøren for Norge 90 % av normalen. Det kom betydelig mindre nedbør enn normalt i Nord-Norge. Flere stasjoner i Finnmark fikk under 25% av normal månedsnedbør for juni. Alta lufthavn (FI) fikk kun 4 mm nedbør (12 % av normalen).

Det kom mer nedbør enn normalt på Vestlandet og på deler av Østlandet. Eidfjord – Bu (HO) fikk 184 mm (242 % av normalen) og Prestebakke (ØF) fikk 134 mm (172 % av normalen).


Kvamskogen (HO) fikk størst månedsnedbør av værstasjonene med 241 mm (134 % av normalen) etterfulgt av Modalen (HO) som fikk 235 mm (168 %) og Bergen - Florida (HO) med 217 mm (164 %). Alta lufthavn (FI) fikk minst nedbør av værstasjonene med 4 mm (12 % av normalen) etterfulgt av Karasjok (FI) som fikk 6 mm (14 %).


To av værstasjonene på Østlandet satt ny månedsrekord for døgnnedbør. Rygge (ØF) fikk 41,4 mm og Sarpsborg (ØF) fikk 39,3 mm (begge 24. juni). Dette er den største døgnnedbøren som er blitt målt i juni på disse stasjonene siden målingene startet i henholdsvis 1955 og 1957.


Sande – Laukollmyr (VE) målte størst døgnnedbør av værstasjonene med 62,2 mm 24. juni.


Døgntemperatur og døgnnedbør


Juni 2003
















Døgntemperatur | Varmere enn normalen | Kaldere enn normalen | Døgnnedbør


Nedbøren er målt kl. 07 normaltid og er falt i løpet av foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for temperaturdøgnet (kl. 19-19).
Med normalen menes her middel for perioden 1961-1990. Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf.
Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.


Døgntemperatur og døgnnedbør


Juni 2003















Døgntemperatur


Varmere enn normalen


Kaldere enn normalen


Døgnnedbør

Nedbøren er målt kl. 07 normaltid og er falt i løpet av foregående 24 timer. Døgntemperaturen er middeltemperaturen for temperaturdøgnet (kl. 19-19).
Med normalen menes her middel for perioden 1961-1990. Merk at skalaen for temperatur- og nedbøraksene varierer fra graf til graf.
Ved bruk av diagrammene skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.

Tabell for juni 2003 er nå tatt ut.


Tabell for juni 2003 er nå tatt ut.

Klimatologisk hurtigoversikt

Januar - Juni 2003

Nedbør

Utjevnet nedbørsum
i prosent av normal



Normalperioden er 1961 - 1990


Utgitt: 01.07.2003
Ved bruk av kart, tekst og tall skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.

Klimatologisk hurtigoversikt

Januar - Juni 2003

Lufttemperatur

Utjevnet avvik i ° C fra normal sesongtemperatur



Normalperioden er 1961 - 1990.

Utgitt: 01.07.2003
Ved bruk av kart, tekst og tall skal det gjøres oppmerksom på at de kommer fra Meteorologisk institutt.

Lufttemperatur og nedbør hittil i år

Januar-juni 2003

Middeltemperaturene for de seks første månedene av 2003 er over normalene i hele landet. I deler av Nord-Norge kom det halvannen til to ganger mer nedbør enn normalt.

Lufttemperatur

Middeltemperaturen for Norge de seks første månedene av 2003 er 1,2 °C *over* normalen. Størst avvik fra normalen er det i Finnmark og i de høyereliggende områdene av Sør-Norge, der temperaturen er 1,5–2,0 °C *over* normalen.

De høyeste middeltemperaturene for perioden januar-juni kom i kystområdene fra Hordaland til Møre og Romsdal. Bergen – Florida (HO) har 7,0 °C (1,0 °C over normalen), Vigra (MR) og Hellisøy fyr (HO) har begge 6,6 °C (henholdsvis 1,5 °C og 1,3 °C over normalen). De laveste middeltemperaturene kom på Finnmarksvidda hvor Sihcajavri (FI) har –4,5 °C (1,7 °C over normalen), Kautokeino (FI) har –4,1 °C (1,5 °C over normalen) og Cuovddatmohkki (FI) har –3,9 °C (1,8 °C over normalen).

Den høyeste maksimumstemperaturen hittil i år kom på Nesbyen – Skoglund (BU) med 28,6 °C 27. juni. Den laveste minimumstemperaturen kom i Karasjok (FI) med –42,5 °C 1. februar.

Nedbør

Basert på observasjoner fra værstasjonene er nedbøren i Norge 115 % av normalen for perioden januar-juni. Det har falt betydelig mer nedbør enn normalt i deler av Nord-Norge. På Slettnes fyr (FI) har det kommet 452 mm (200 % av normalen), noe som er den største nedbørsummen som er blitt målt i perioden januar-juni på denne stasjonen siden målingene startet i 1927.

Modalen (HO) har med 1509 mm (141 % av normalen) fått *mest* nedbør av værstasjonene hittil i år etterfulgt av Takle (SF) med 1365 mm (109 % av normalen) og Bergen – Florida (HO) med 1099 mm (128 % av normalen). Saltdal (NO) har med 33 mm (28 % av normalen) fått *minst* nedbør av værstasjonene hittil i år etterfulgt av Karasjok (FI) med 100 mm (91 % av normalen) og Cuovddatmohkki (FI) med 129 mm (95 % av normalen).

Modalen (HO) har målt den største døgnnedbøren av værstasjonene hittil i år med 106,8 mm 18. januar. Det er den nest høyeste døgnnedbøren som er målt i Modalen i januar de siste 50 år.