



EKSAMENSOPPGAVE I MAT-1001

Eksamen i : Mat-1001
Dato : Mandag 11. desember 2006
Tid : Kl 0900 - 1300
Sted : Åsgårdvegen 9, lavblokka
Tillatte hjelpemidler : Rottmanns tabeller
To A4-ark (4 sider) med egne notater
Godkjent Kalkulator

Målform : Nynorsk

Oppgavesettet er på 3 sider inkl. forside

Kontaktperson: Tor Flå tlf: 77644024

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 40 01, Telefaks 77 64 47 65

Oppgave 1

a) Finn grenseverdien $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n - \sqrt{1+n^2}}{n + \sqrt{1+n^2}} \right)$.

b) Du får gjeve differenselikninga

$$z_{n+2} + 2z_{n+1} + \frac{3}{4}z_n = 0.$$

Finn den generelle løysinga til differenselikninga.

c) Løys startverdiproblemet $z_{n+2} + 2z_{n+1} + 2z_n = 0$ for $z_0 = 1$ og $z_1 = 0$.

Oppgave 2

a) Har $f(x) = x^2 \ln(|x|^{1/2}) - x^2 + \frac{1}{2}$ nullpunkt på intervallet $[1, e^2]$?

b) Berekn $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Definer $f(0) = \frac{1}{2}$.

Argumenter for at $f(x)$ er kontinuerleg med denne utvidinga.

c) Finn $f'(0)$ for den utvida $f(x)$ i 2b).

Oppgave 3

a) Vis at $\frac{x^4}{(x^2+1)(x-1)} = x + 1 + \frac{1}{(1+x^2)(x-1)}$.

Tips: Du må først skrive polynomet i nevneran som $(x^2 + 1)(x - 1) = x^3 - x^2 + x - 1$.

b) Berekn det ubestemte integralet

$$\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)(x - 1)} dx.$$

c) For hvilke x kan ein finne antideriverte til $f(x) = \frac{x^4}{(1+x^2)(x-1)}$ på forma

$$F(x) = \int_2^x \frac{t^4}{(t^2 + 1)(t - 1)} dt.$$

Berekne den antideriverte.

Oppg ve 4

Du f r gjeve differensiallikninga

$$y'' + 4y' + (4 + k)y = 0, \quad k \in \mathbf{R}.$$

a) For hvilke k har karakteristisk likning til differensiallikninga to reelle l ysingar?
For hvilken k er l ysinga av karakteristisk likning sammenfallande reell?

b) Kva er den generelle l ysinga av differensiallikninga for $k = -\frac{1}{4}$?

c) Finn ei partikul rl ysing til

$$y'' + 4y' + \frac{15}{4}y = e^{-2x}.$$

Finn hvilket startverdiproblem $y(0) = y_0 = y_0$ og $y'(0) = y_1$ som gjev ei l ysing som er partikul rl ysing utan bidrag fr  den homogene l ysinga i 4b).

