



EKSAMENSOPPGAVE I STA-2002

Eksamen i : Sta-2002 Videregående statistikk
Dato : Mandag 11. desember 2006
Tid : Kl. 0900–1300
Sted : Åsgårdvegen 9
Tillatte hjelpemidler : 4 sider (A4) egne notater
Godkjent kalkulator
Rottmanns formelsamling

Oppgavesettet er på 6 sider inklusive forside.

Kontaktperson: Sigrunn H. Sørbye, tlf. 77 64 55 04/92 43 97 22

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 40 01, Telefaks 77 64 47 65

Oppgave 1

La X angi en kji-kvadratfordelt variabel med p frihetsgrader (se side 4).

a) Vis at

$$E(X^k) = \frac{2^k \Gamma(\frac{p}{2} + k)}{\Gamma(\frac{p}{2})}, \quad k > -p/2$$

og bruk dette til å vise at $E(X) = p$ og $Var(X) = 2p$.

Oppgave 2

Anta at $Y_1, \dots, Y_n$ er uavhengige og identisk fordelte stokastiske variable fra en eksponensiell familie

$$f(y | \theta) = h(y)c(\theta)e^{w(\theta)t(y)}.$$

a) Bevis at $T(\mathbf{Y}) = \sum_{j=1}^n t(Y_j)$ vil være en suffisient observator for θ .

Vis at maximum likelihood estimatoren for parameteren θ vil være en funksjon av den suffisiente observatoren $T(\mathbf{Y})$.

Vi antar i resten av denne oppgaven at sannsynlighetstettheten til $Y_1, \dots, Y_n$ er gitt ved

$$f(y | \theta) = \theta y^{\theta-1}, \quad 0 < y < 1, \quad \theta > 0.$$

b) Vis at $f(y | \theta)$ kan uttrykkes som en eksponensiell familie og finn en suffisient observator for θ . Begrunn hvorfor den suffisiente observatoren vil være komplett.

c) Vis at maximum likelihood estimatoren for θ er gitt ved

$$\hat{\theta}_{mle} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(Y_i)}.$$

d) Vis at

$$W_n = -2\theta \sum_{i=1}^n \ln(Y_i) \sim \chi_{2n}^2.$$

(Hint: Vis først at $W_1 \sim \chi_2^2$).

e) Benytt forrige punkt samt oppgave 1 til å vise at en forventningsrett estimator for θ er gitt ved

$$\tilde{\theta} = \frac{n-1}{n} \hat{\theta}_{mle}, \quad n > 1.$$

- f) Finn $Var(\tilde{\theta})$ og sammenlign denne med Cramer-Rao's nedre grense for variansen til en forventningsrett estimator for θ . Vil $\tilde{\theta}$ være den beste forventningsrette estimatoren (UMVUE) for θ ? Begrunn svaret.

Basert på at $\hat{\theta}_{mle}$ er tilnærmet normalfordelt vil et approksimert $(1 - \alpha)100\%$ konfidensintervall for θ være gitt ved

$$\hat{\theta}_{mle} \pm u_{\alpha/2} \frac{\hat{\theta}_{mle}}{\sqrt{n}}$$

der $u_{\alpha/2}$ angir øvre kvantil for en standard normalfordeling.

- g) Er W_n en pivotal størrelse? Begrunn svaret. Utled et eksakt $(1 - \alpha)100\%$ konfidensintervall for θ . Sammenlign lengden av dette intervallet med lengden av intervallet basert på normaltilnærming for $n = 10$ og $\alpha = 0.05$. Kommenter!

Oppgave 3

Anta $X_1, \dots, X_n$ uavhengig og identisk normalfordelt med forventning μ og varians lik 1. Da vil $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ være en suffisient observator for μ der $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n})$. Anta at apriorifordelingen for parameteren μ er gitt ved en standard normalfordeling, dvs $\pi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\mu^2}$.

- a) Forklar hva det vil si at normalfordelingen er sin egen konjugerte familie.

Vis at

$$\pi(\mu | \bar{x}) \propto e^{-\frac{n+1}{2}(\mu - \frac{n}{n+1}\bar{x})^2}$$

og konkluder med at $\mu | \bar{x} \sim N(\frac{n}{n+1}\bar{x}, \frac{1}{n+1})$.

Vi ønsker å teste hypotesene

$$H_0 : \mu \leq 0, \quad H_1 : \mu > 0.$$

- b) Anta at $n = 20$ og $\bar{x} = 0.37$. Beregn sannsynlighetene

$$P(\mu \leq 0 | \bar{x}) \text{ og } P(\bar{X} > \bar{x} | \mu = 0).$$

Hva angir disse to sannsynlighetene i forbindelse med hypotesetestingen. Ville du forkastet den gitte nullhypotesen på et 5% signifikansnivå basert på disse resultatene? Begrunn svaret.

Sannsynlighetsfordelinger og formler

Normalfordeling: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x | \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad \sigma > 0.$$

Kji-kvadratfordeling: $X \sim \chi_p^2$

$$f(x | p) = \frac{1}{\Gamma(\frac{p}{2})2^{\frac{p}{2}}} x^{\frac{p}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}; \quad x \geq 0, \quad p = 1, 2, \dots$$

$$M_X(t) = (1 - 2t)^{-\frac{p}{2}}, \quad t < \frac{1}{2}$$

Gammafunksjonen:

$$T(\alpha) = \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy, \quad \alpha > 0$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \alpha > 0$$

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)! \text{ dersom } \alpha \text{ er et positivt heltall}$$

[illegible]

χ^2 - FORDELING

$$P(Z > z_{\alpha, \nu}) = \alpha$$

$\alpha \backslash \nu$	.995	.990	.975	.950	.050	.025	.010	.005
1	.00	.00	.00	.00	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.01	.02	.05	.10	5.99	7.38	9.21	10.60
3	.07	.11	.22	.35	7.81	9.35	11.34	12.84
4	.21	.30	.48	.71	9.49	11.14	13.28	14.86
5	.41	.55	.83	1.15	11.07	12.83	15.09	16.75
6	.68	.87	1.24	1.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	.99	1.24	1.69	2.17	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	79.08	83.30	88.37	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	90.53	95.02	100.42	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	101.88	106.63	112.32	116.31
90	59.20	61.75	65.65	69.13	113.14	118.13	124.11	128.29
100	67.33	70.06	74.22	77.93	124.34	129.56	135.80	140.16