

UNIVERSITETET I TROMSØ

Det matematisk-naturvitenskapelige Fakultet

Eksamen i: MAT-1005, Diskret matematikk 1
Dato: Torsdag 16. desember 2004
Tid for eksamen: 1500-1900
Tillatte hjelpemiddel: Godkjent kalkulator, 2 A4-ark (4 sider) med egne notat (enten handskrivne eller trykte) og Rottmanns tabellar

Oppgavesettet er på 2 sider.

Kontaktperson: Loren Olson, tlf. 99701428

Begrunn alle svarene.

Oppgave 1

La n vere eit positivt heiltal. Skriv $n = (a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0)_{10}$ i ei desimalutvikling. Vis at n er deleleg med 3 viss og berre viss $a_k + a_{k-1} + \cdots + a_1 + a_0$ er deleleg med 3.

Oppgave 2

Kor mange positive heiltal mellom 1000 og 2999 er deleleg med 5 men ikkje med 7?

Oppgave 3

Vi er gitt følgande fem symbol med deira respektive hyppigheter: $(a : 0, 20), (b : 0, 10), (c : 0, 15), (d : 0, 25), (e : 0, 30)$. Finn ein optimal prefikscode.

Oppgave 4

Finn den største fellesdivisor d av 5 og 23, og finn heiltal x og y slik at $5x + 23y = d$. Har 5 ein invers modulo 23?

Oppgave 5

Vi kastar to terningar. Kva er sannsynet for at summen er ≥ 10 ? ≥ 9 ? ≥ 8 ? Dersom vi kastar tre terningar, kva er sannsynet for at summen er 16?

Oppg ve 6

Sj  p  den urettede grafen $G = (V, E)$ der $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ og $E = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, f), (f, d), (f, e), (d, e)\}$. Tegn G . Har G ein Euler sykel? Har G ein Euler veg? Har G ein Hamiltonveg?

Oppg ve 7

L ys rekurrensrelasjonen $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ med startverdiar $a_0 = 1, a_1 = 0$. L ys den samme rekurrensrelasjonen for startverdiar $a_0 = 0, a_1 = 1$.

Oppg ve 8

Bruk matematisk induksjon til   vise at summen av dei n f rste odde positive heiltala er n^2 , dvs. $\sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$.