
Leinøra naturreservat



Tindved



Strandsnipe

Leinøra

er avsetninger av løsmasser fra elvestrømmen, i hovedsak sand og grus. Her har det utviklet seg et tynt moldjordlag ("matjord") på de stedene som ligger høyest og er minst påvirket av elvestrøm og tidevann. Her finnes også større arealer med strandeng og sumpmark.

Leinøra har lenge vært kjent for sin storvokste tindvedforekomst. Stammehøyder på opptil 11 meter er målt. Dette er de høyeste tindvedtrærne i verden! Tindveden er en typisk pionerplante, dvs. at den er blant de første som koloniserer ubevokst mark. Når tindveden vokser opp utvikler den etterhvert et godt jordsmonn, noe som gjør at andre trearter kan "rykke inn". Resultatet er at tindveden gradvis blir utkonkurrert og til slutt forsvinner. På Leinøra ser vi dette ved at gråor, selje, osp, hegg, rogn og gran har etablert seg. Så lenge Gaula legger opp nye grusører, har imidlertid tindveden et godt eksistensgrunnlag.

Tindvedkrattet er svært tett og har en underskog bl.a. av villrips, bringebær og slyngsøtvier i blanding med høye og storbladede urter. Slyngplanten humle er et karakteristisk innslag. Sjeldne planter som myrrapp og gul frøstjerne finnes også her.

Strandeng- og sumpvegetasjonen er dominert av bl.a. saltsiv, rustsivaks, havstarr og pøylestarr.

Fuglelivet

er rikt og variert, særlig i sommerhalvåret. Spesielt spurvefuglene setter sitt preg på området. I mai og juni er fuglesangen spesielt intens, og sangkoret inkluderer foruten en rekke troster og sangere bl.a. rødstrupe, bokfink, gulspurv og sivspurv. Møller og sivsanger er registrert flere ganger. Sjeldne spurvefugler som myrsanger, bøksanger og rosenfink er også observert i området.

Om høsten bugner tindveden av saftige, bærliknende steinfrukter som spises av mange fuglearter. Stær og diverse troste- og finkearter kan da opptre i store flokker, enkelte ganger har tusentalls fugler tilhold her.

Ved fjære sjø blottlegges fine mudderflater som trekker til seg vadefugler og gressender. Blant de vanligste vadefuglene er vipe, rødstilk, strandsnipe og gluttsnipe. Dverglo, temmincksnipe, skogsnipe og grønnstilk kan sees i sommerhalvåret. Myrsnipe, dvergsnipe, tundrasnipe og sotsnipe besøker Leinøra om høsten. De vanligste andefuglene ved Leinøra er stokkand, krikkand, gravand, kvinand og siland.




Humle



Sivspurv



Gulsanger




Gulfrøstjerne



Pøylestarr



Gråor



Gluttsnipe



Utdrag av vernebestemmelsene

Leinøra i Trondheim kommune ble først fredet i 1971, men ble 23. desember 1983 varig vernet som naturreservat ved kongelig resolusjon. Reservatet dekker et areal på ca. 55 dekar landareal.

Formålet med fredningen er å bevare en grusør med en unik forekomst av tindved.

Du er velkommen til å besøke reservatet. Følgende vernebestemmelser bør du imidlertid merke deg:

- Vegetasjonen både på land og i vann er fredet mot skade og ødeleggelse. Sanking av bær og matsopp er tillatt.
- Alt vilt, også deres bo, er fredet hele året mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
- ***Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.***
- Tekniske inngrep i naturmiljøet er forbudt.
- Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
- Motorisert ferdsel er forbudt.



For ytterligere informasjon, kontakt:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 7468 Trondheim, Tlf.: 73 19 90 00

Trondheim kommune, 7004 Trondheim, Tlf.: 72 54 00 00