

Matematisk modellering – med vekt på lineær algebra

Geir Dahl
Matematisk institutt, CMA

March 19, 2007

Plan

Tirsdag 20.mars.:

- ▶ 8.30-10 Teori: **Lineære likningssystemer**
- ▶ 10-12.30 *Oppgaveregning* + Diskusjon
- ▶ 12.30 Lunsj
- ▶ 13.15-14.30 Teori: **Lineær optimering**
- ▶ 14-16 *Oppgaveregning* + Diskusjon

Mandag 26.mars:

- ▶ 8.30-10 Teori: **Regresjon**
- ▶ 10-12.30 *Oppgaveregning* + Diskusjon
- ▶ 12.30 Lunsj
- ▶ 13.15-14 Teori: **Vekstmodeller**
- ▶ 14-15.30 *Oppgaveregning* + Diskusjon

Lineære likningssystemer: Hovedpunkter

- ▶ hva er lineære likninger
- ▶ finne løsning: eliminasjon
- ▶ alternativ metode: matrisemetoden
- ▶ teoretiske resultater

Hva er lineære likninger (LL)?

$$2x + 3y = 4$$

$$4x - 8y = -6$$

- ▶ hva: tall ganget med variabel, og sum av slike ledd
- ▶ variable=ukjente
- ▶ 2×2 , 3×5 , ... $m \times n$
- ▶ hva med ulineære likninger?
- ▶ hvor dukker slike problemer opp?

Hva er lineære likninger (LL)?

$$2x + 3y = 4$$

$$4x - 8y = -6$$

- ▶ hva: tall ganget med variabel, og sum av slike ledd
- ▶ variable=ukjente
- ▶ 2×2 , 3×5 , ... $m \times n$
- ▶ hva med ulineære likninger?
- ▶ hvor dukker slike problemer opp?
- ▶ OVERALT: moderne beregninger i teknikk, strømningsproblemer (gass/olje), lyd- og billedbehandling, økonomi, klima/vær modeller
- ▶ systemer med avhengigheter mellom komponenter

Hvordan løse LL?

Eliminasjonsmetoden:

$$\begin{array}{rcl} 2x & + & 3y = 4 \\ 4x & - & 8y = -6 \end{array}$$

1. Ved å skrive om første likning får vi $x = 2 - (3/2)y$. Dette uttrykker x entydig ut fra y (vi sier at x er en *funksjon* av y).
2. Så erstatter vi x i den andre likningen med det uttrykket vi nettopp fant, og får $4(2 - (3/2)y) - 8y = -6$.
3. Den siste likningen har bare én ukjent, og vi finner løsningen $y = 1$. Dermed finner vi også x ut fra vår omskrivning av første likning: $x = 2 - (3/2) \cdot 1 = 1/2$. Så, løsningen av likningssystemet er $x = 1/2$, $y = 1$.

Sentrale spørsmål for LL

- ▶ har systemet (minst) en løsning?
- ▶ er det en unik løsning?
- ▶ hvordan finne én evt. alle løsningene?

Alle kan besvares ved **(Gauss) eliminasjon!**

(Carl F. Gauss (1777–1855))

Eks: rette linjer i planet

- ▶ finn en rett linje (i planet) som går gjennom punktene $(1, 2)$ og $(5, 3)$.
- ▶ linjen $l : y = ax + b$
- ▶ krav: $a \cdot 1 + b = 2$, og $a \cdot 5 + b = 3$
- ▶ så: 2×2 lineært likningssystem

Eks: rette linjer i planet

- ▶ finn en rett linje (i planet) som går gjennom punktene $(1, 2)$ og $(5, 3)$.
- ▶ linjen $l : y = ax + b$
- ▶ krav: $a \cdot 1 + b = 2$, og $a \cdot 5 + b = 3$
- ▶ så: 2×2 lineært likningssystem

Generelt:

- ▶ finn linje som går gjennom punktene (x_1, y_1) og (x_2, y_2) (der $x_1 \neq x_2$)
- ▶ får igjen 2×2 lineært likningssystem
- ▶ løser og finner linjen

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1).$$

Eks: plan i rommet

- ▶ plan: beskrives ved likningen $ax + by + cz = 1$
- ▶ så 1×3 LL
- ▶ problem: gitt punkter $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ og $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$, finn plan gjennom disse
- ▶ får 3×3 LL

$$ax_1 + by_1 + cz_1 = 1$$

$$ax_2 + by_2 + cz_2 = 1$$

$$ax_3 + by_3 + cz_3 = 1$$

- ▶ NB: her er variablene a , b og c
- ▶ tilsvarende gjelder i høyeredimensjonale rom (n variable)

Form på LL

- ▶ LL 3×3 system: variable x_1, x_2, x_3

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

- ▶ gitt: $a_{11}, a_{12}, \dots$: koeffisienter, og høyreside b_1, b_2, b_3
- ▶ a_{ij} : første indeks i angir rad, andre kolonne

Form på LL

- ▶ LL 3×3 system: variable x_1, x_2, x_3

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

- ▶ gitt: $a_{11}, a_{12}, \dots$: koeffisienter, og høyreside b_1, b_2, b_3
- ▶ a_{ij} : første indeks i angir rad, andre kolonne
- ▶ LL $m \times n$ system: variable $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Gauss, del I: Forovereliminasjon

- ▶ Løs likning 1 mhp. x_1 , dvs. finn x_1 uttrykt ved de øvrige variablene. Bruk dette uttrykket til å eliminere x_1 i likning 2, likning 3 osv.

Gauss, del I: Forovereliminasjon

- ▶ Løs likning 1 mhp. x_1 , dvs. finn x_1 uttrykt ved de øvrige variablene. Bruk dette uttrykket til å eliminere x_1 i likning 2, likning 3 osv.
- ▶ Betrakt likning 2 i det nye systemet og bruk denne til å finne x_2 uttrykt ved $x_3, x_4, \dots, x_n$. Bruk uttrykket for x_2 til å eliminere x_2 i likning 3, likning 4 osv.

Gauss, del I: Forovereliminering

- ▶ Løs likning 1 mhp. x_1 , dvs. finn x_1 uttrykt ved de øvrige variablene. Bruk dette uttrykket til å eliminere x_1 i likning 2, likning 3 osv.
- ▶ Betrakt likning 2 i det nye systemet og bruk denne til å finne x_2 uttrykt ved $x_3, x_4, \dots, x_n$. Bruk uttrykket for x_2 til å eliminere x_2 i likning 3, likning 4 osv.
- ▶ Fortsett slik inntil man har eliminert x_{n-1} fra siste likning.

Dette forenkler likningssystemet!

Gauss, del I: Forovereliminasjon

- ▶ Løs likning 1 mhp. x_1 , dvs. finn x_1 uttrykt ved de øvrige variablene. Bruk dette uttrykket til å eliminere x_1 i likning 2, likning 3 osv.
- ▶ Betrakt likning 2 i det nye systemet og bruk denne til å finne x_2 uttrykt ved $x_3, x_4, \dots, x_n$. Bruk uttrykket for x_2 til å eliminere x_2 i likning 3, likning 4 osv.
- ▶ Fortsett slik inntil man har eliminert x_{n-1} fra siste likning.

Dette forenkler likningssystemet!

- ▶ hva med løsningsmengden? Ekvivalens.
- ▶ struktur på det forenklete systemet

Gauss, del II: Tilbakesubstitusjon

- ▶ siste likning har bare x_n som ukjent: løs den!
- ▶ Likning nr. $n - 1$ inneholder bare variablene x_{n-1} og x_n , og siden vi har bestemt x_n , finner vi her x_{n-1} .
- ▶ fortsett slik med likning $n - 2$ osv.

Resultat: vi finner en løsning av likningssystemet.

Eksempel

Systemet:

$$\begin{array}{cccccccl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 4 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 7 \end{array}$$

Forovereliminasjon:

- ▶ finner fra likning 1: $x_1 = 3 - x_2 + x_3 - 2x_4$
- ▶ setter dette inn i likning 3 (likning 2 er allerede fri for x_1).
- ▶ får nytt system

Eksempel

Systemet:

$$\begin{array}{rcccccccl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 4 \\ x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 7 \end{array}$$

Forovereliminasjon:

- ▶ finner fra likning 1: $x_1 = 3 - x_2 + x_3 - 2x_4$
- ▶ setter dette inn i likning 3 (likning 2 er allerede fri for x_1).
- ▶ får nytt system

$$\begin{array}{rcccccccl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 4 \\ & & & & 2x_3 & - & 2x_4 & = & 4 \end{array}$$

Eks. forts.

- ▶ neste variabel: x_3 fordi x_2 ble eliminert ved en “tilfeldighet”.
- ▶ fra likning 2 finner vi x_3 og bruker dette til å eliminere x_3 fra likning 3:

$$\begin{array}{rcccccccl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ & & & & x_3 & + & x_4 & = & 4 \\ & & & & & - & 4x_4 & = & -4 \end{array}$$

Dette avslutter forovereliminering.

Eks. forts.

Tilbakesubstitusjon:

- ▶ fra likning 3 får vi $x_4 = 1$
- ▶ dermed gir likning 2 at $x_3 = 4 - x_4 = 4 - 1 = 3$.
- ▶ Endelig, første likning gir
$$x_1 = 3 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 3 - x_2 + 3 - 2 \cdot 1 = 4 - x_2.$$
- ▶ Så: x_2 er ikke entydig bestemt
- ▶ den generelle løsningen er

$$x_1 = 4 - x_2, \quad x_2 \text{ er fri}, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 1.$$

Gauss eliminasjon: oppsummering

Så: Gauss eliminasjon:

Gauss eliminasjon: oppsummering

Så: Gauss eliminasjon:

- ▶ **1. Forovereliminasjon:** bruker likning k til å eliminere x_k i likningene $k + 1, k + 2, \dots, n$ for $k = 1, 2, \dots, n$,
- ▶ **2. Tilbakesubstitusjon:** bruker likning k til å bestemme x_k (variablene $x_{k+1}, \dots, x_n$ er allerede bestemt) for $k = n, n - 1, \dots, 1$.

Kommentarer

Forenklet litt, men metoden virker generelt ved et par justeringer:

Kommentarer

Forenklet litt, men metoden virker generelt ved et par justeringer:

- ▶ Det er f.eks. ikke sikkert at x_1 forekommer i likning 1, men kanskje i likning 4 (for første gang). Da kan vi bytte likning 1 og likning 4, og gå videre med eliminasjonen. Kalles (rad)pivotering.
- ▶ Underveis i prosessen kan det også hende at vi må hoppe over neste variabel fordi den allerede har blitt eliminert “ved en tilfeldighet”; dette skjedde med x_2 i eksemplet.

Løsningsmengden

Hva med løsningsmengden?

Løsningsmengden

Hva med løsningsmengden?

Teorem: *Ethvert $m \times n$ lineært likningssystem har enten ingen løsning, en unik løsning eller uendelig mange løsninger.*

Matrisemetoden

- ▶ Bortsett fra små problemer løses LL på datamaskiner
- ▶ eliminasjonsmetoden må forendres slik at dette blir mulig.
- ▶ Maskinen regner med tall, ikke symbolsk med variable...

Matrisemetoden

- ▶ Bortsett fra små problemer løses LL på datamaskiner
- ▶ eliminasjonsmetoden må forendres slik at dette blir mulig.
- ▶ Maskinen regner med tall, ikke symbolsk med variable...

LL i eks. foran kan representeres ved en **matrise** (= rektangulær tabell med tall):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

- ▶ **rader** og **kolonner**
- ▶ rader: likninger, kolonner: variable
- ▶ siste kolonne: høyresiden
- ▶ **utvidet koeffisientmatrise**

Elementære radoperasjoner

- ▶ R1: *bytt om to rader*
- ▶ R2: *multipliser en rad med et tall ulik 0*
- ▶ R3: *adder et multiippel av en rad til en annen rad.*

Elementære radoperasjoner

- ▶ *R1: bytt om to rader*
- ▶ *R2: multipliser en rad med et tall ulik 0*
- ▶ *R3: adder et multiippel av en rad til en annen rad.*

Tolkning på LL:

- ▶ R1: bytte om rekkefølgen på to likninger
- ▶ R2: gange en likning med et tall (ulik 0)
- ▶ R3: adder et multiippel av en likning til en annen likning.

Vi har nå følgende enkle, men viktige, resultat.

Elementære radoperasjoner

- ▶ *R1: bytt om to rader*
- ▶ *R2: multipliser en rad med et tall ulik 0*
- ▶ *R3: adder et multiippel av en rad til en annen rad.*

Tolkning på LL:

- ▶ R1: bytte om rekkefølgen på to likninger
- ▶ R2: gange en likning med et tall (ulik 0)
- ▶ R3: adder et multiippel av en likning til en annen likning.

Vi har nå følgende enkle, men viktige, resultat.

Teorem: *Radoperasjonene R1, R2 eller R3 bevarer løsningsmengden til likningssystemet.*

Eksempel

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Adder først (-1) ganget med første rad til tredje rad. Dette gir

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Legg merke til at det tilsvarende likningssystemet er

$$x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 3, \quad x_3 + x_4 = 4, \quad 2x_3 - 2x_4 = 4$$

Eks. forts.

Vi fortsetter nå og adderer (-2) ganget med andre rad til tredje rad, og får

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \end{bmatrix}$$

Dette avslutter forovereliminasjon, og vi finner en løsning ved tilbakesubstitusjon.



Redusert trappeform

Fortsette reduksjonen ytterligere: Først multipliserer vi tredje rad med $-1/4$ og får

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Så adderer vi (-1) ganget med tredje rad til andre rad og (-2) ganget tredje rad til første rad, og får

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Redusert trappeform forts.

Og til slutt addererer vi andre rad til første rad, som gir

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Vi ser at det tilhørende likningssystemet er (som før)

$$x_1 + x_2 = 4, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 1 \quad (\text{og } x_2 \text{ fri})$$

Siste matrise kalles den **reduserte trappeformen** til den opprinnelige matrisen.

Redusert trappeform - teori

Redusert trappeform betyr at:

- ▶ første ikkenull i hver rad er en ener (kalles ledende ener)
- ▶ de ledende enerne ligger til høyre når man går nedover i radene
- ▶ over (og under) hver ledende ener er det bare nuller
- ▶ evt. rader med bare nuller er samlet til slutt.

Følgende generelle resultat holder.

Redusert trappeform - teori

Redusert trappeform betyr at:

- ▶ første ikkenull i hver rad er en ener (kalles ledende ener)
- ▶ de ledende enerne ligger til høyre når man går nedover i radene
- ▶ over (og under) hver ledende ener er det bare nuller
- ▶ evt. rader med bare nuller er samlet til slutt.

Følgende generelle resultat holder.

Teorem: *Enhver $m \times n$ matrise A kan ved radoperasjoner reduseres til en unik matrise M som er på redusert trappeform.*

Løsningsmengden til det tilhørende lineære likningssystemet kan leses ut fra M .

Litt ekstra: vektorrom

Ytterligere innsikt i strukturen til løsningsmengden av LL.

- ▶ variablene ordnes i et **n -tupple**

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

- ▶ kalles en **vektor**
- ▶ mengden av alle slike n -vektorer danner en algebraisk struktur, betegnet $\mathbb{R}^n$, som man kaller et **vektorrom**.
- ▶ addisjon av vektorer, multiplikasjon med tall (skalarer) (komponentvis)
- ▶ $(1, 4, 2) + (-1, 1, 0) = (0, 5, 2)$ og $2(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$.
- ▶ Et **lineært underrom** i $\mathbb{R}^n$ er en delmengde L som er lukket under addisjon av vektorer og multiplikasjon med tall.

Vektorrom forts.

Teorem:

- ▶ *Betrakt et lineært likningsystem der alle tallene på høyre side er 0 (systemet kalles da homogent)*
- ▶ *Da er løsningsmengden til systemet et lineært underrom.*
- ▶ *Videre finnes det vektorer $z^1, z^2, \dots, z^k \in \mathbb{R}^n$ slik at denne løsningsmengden består av alle vektorer*

$$x = t_1 z^1 + t_2 z^2 + \dots + t_k z^k$$

der $t_1, t_2, \dots, t_k$ er vilkårlige reelle tall.

- ▶ *Løsningsmengden til et inhomogent system er en translasjon av et lineært underrom (dette kalles en affin mengde), dvs. vi adderer en fast vektor z^0 til alle vektorene i underrommet.*

Programvare demo.

▶ MATLAB

▶ ...

Lineær optimering: Hovedpunkter

- ▶ hva er lineær optimering = LP
- ▶ hvordan løse: simpleksalgoritmen
- ▶ anvendelser
- ▶ teoretiske resultater



Optimering

- ▶ matematisk optimering
- ▶ minste evt. største verdi på en gitt funksjon
- ▶ basert på lineær algebra og analyse
- ▶ Feltet deles opp ut fra egenskaper ved problemene som funksjonstype og begrensninger på variablene.
- ▶ skal se paa lineær optimering
- ▶ vil maksimere en lineær funksjon i flere variable under lineære begrensninger på variablene.
- ▶ også kalt LP - lineær programmering
- ▶ George B. Dantzig (1914–2005)

Eksempel - begreper

maksimer $4x_1 + 3x_2 + 5x_3$
forutsatt at

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 25 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0.\end{aligned}$$

- ▶ variable (de ukjente) x_1 , x_2 og x_3 .
- ▶ Funksjonen $f(x) = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3$ vi ønsker å maksimere kalles **objektivfunksjonen**, (**målfunksjonen**).
- ▶ vil **maksimere f under lineære begrensninger på variablene**. Ser at maksimumsverdien, **optimal verdi**, er 125 og at tilhørende **optimal løsning** er $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 25$, eller $x = (0, 0, 25)$.

Litt verre....

maksimer
forutsatt at


$$\begin{array}{rclclclcl}
 4x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & - & 3x_4 & & \\
 3x_1 & - & x_2 & + & 7x_3 & + & x_4 & \leq & 12 \\
 x_1 & + & 3x_2 & - & 16x_3 & + & 3x_4 & \leq & 2 \\
 -4x_1 & + & 5x_2 & + & 7x_3 & - & 9x_4 & \leq & 24 \\
 12x_1 & - & 4x_2 & + & x_3 & + & 2x_4 & \leq & 8 \\
 x_1 & - & x_2 & + & x_3 & + & 2x_4 & \leq & 9 \\
 & & & & x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 & &
 \end{array}$$

Problemer og metoder

- ▶ anvendelser: mange variable og begrensninger, gjerne tusenvis og av og til oppimot flere millioner.
- ▶ bruker datamaskiner
- ▶ trenger effektive metoder
- ▶ simpleksmetoden er en slik praktisk effektiv metode.
- ▶ fra 1951, men kontinuerlig videreutviklet

LP i to variable

- ▶ illustrerende
- ▶ av interesse i bl.a. finans, DEA analyse i økonomi, statistikk
- ▶ området av tillatte løsninger er et **polyeder**
- ▶ løsninger med samme verdi på f er linjer som står vinkelrett på c .



Simpleksmetoden

- ▶ Generell metode for LP problemer.
- ▶ Er implementert i programsystemer
- ▶ Metoden bygger videre på eliminasjon!

Simpleksmetoden

- ▶ Generell metode for LP problemer.
- ▶ Er implementert i programsystemer
- ▶ Metoden bygger videre på eliminasjon!

Først: fra ulikheter til likheter.

$$\text{maks } 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

f.a.

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- ▶ Ulikheten $2x_1 + x_2 + x_3 \leq 3$ erstattes med den lineære likningen

$$2x_1 + x_2 + x_3 + w_1 = 3, w_1 \geq 0.$$

Simpleksmetoden

- ▶ w_1 er en ny variabel, kalles en **slakkvariabel**.
- ▶ Den opprinnelige ulikheten holder hvis og bare hvis likningen holder for en eller annen $w_1 \geq 0$.
- ▶ får da

$$\text{maks } 3x_1 + 4x_2 + x_3$$

f.a.

$$\begin{array}{rcll} 2x_1 + x_2 + x_3 + w_1 & & & = 3 \\ x_1 + x_2 & & + w_2 & = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 & & & + w_3 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, w_1, w_2, w_3 & & & \geq 0 \end{array}$$

- ▶ omskrivningen har gitt oss begrensninger som er et 3×6 lineært likningsystem.

Basisliste og basisløsning

- ▶ bare interessert i **ikkenegative løsninger** av dette systemet
- ▶ blant disse, vil vi ha en løsning som maksimerer funksjonen $3x_1 + 4x_2 + x_3$.

Løser likningene med hensyn på variablene w_1 , w_2 og w_3 (som er lettest!) og får (med en noe forenklet skrivemåte)

$$\begin{array}{rccccccc} \xi & = & 0 & + & 3x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 \\ \hline w_1 & = & 3 & - & 2x_1 & - & x_2 & - & x_3 \\ w_2 & = & 2 & - & x_1 & - & x_2 & & \\ w_3 & = & 6 & - & 2x_1 & - & 2x_2 & - & 3x_3 \end{array}$$

Basisliste og basisløsning

$$\begin{array}{rclclclcl}
 \xi & = & 0 & + & 3x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 3 & - & 2x_1 & - & x_2 & - & x_3 \\
 w_2 & = & 2 & - & x_1 & - & x_2 & & \\
 w_3 & = & 6 & - & 2x_1 & - & 2x_2 & - & 3x_3
 \end{array}$$

- ▶ Får en spesiell løsning ved å la alle variablene på høyre side, altså x_1 , x_2 og x_2 , være 0.
- ▶ Da får vi $w_1 = 3$, $w_2 = 2$ og $w_3 = 6$.
- ▶ denne løsningen kalles en **basisløsning**.
- ▶ den tilhørende verdien på objektivfunksjonen er $\xi = 0$.

Simpleksmetoden - hovedidé

Simpleksmetoden består i følgende to skritt som gjentas:

- ▶ 1. bruk basislisten til å sjekke om basisløsningen er optimal
- ▶ 2. hvis ikke optimal, finn en ny basisløsning med større verdi på ξ .

Detaljer 1

- ▶ variablene på venstre side (her w_i -ene) kalles **basisvariable**, mens de på høyre side kalles **ikkebasisvariable**.
- ▶ basisløsningen er ikke optimal fordi vi kan f.eks. øke x_2 og få en høyere verdi på ξ .
- ▶ “naturlig” å øke x_2 (hvorfor?)
- ▶ men: vi beholder $x_1 = x_3 = 0$ (dette er enklest!).

Detaljer 1

- ▶ variablene på venstre side (her w_i -ene) kalles **basisvariable**, mens de på høyre side kalles **ikkebasisvariable**.
- ▶ basisløsningen er ikke optimal fordi vi kan f.eks. øke x_2 og få en høyere verdi på ξ .
- ▶ “naturlig” å øke x_2 (hvorfor?)
- ▶ men: vi beholder $x_1 = x_3 = 0$ (dette er enklest!).
- ▶ hvor mye kan x_2 økes?

Detaljer 2

$$\begin{array}{rclclclcl} \xi & = & 0 & + & 3x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 \\ \hline w_1 & = & 3 & - & 2x_1 & - & x_2 & - & x_3 \\ w_2 & = & 2 & - & x_1 & - & x_2 & & \\ w_3 & = & 6 & - & 2x_1 & - & 2x_2 & - & 3x_3 \end{array}$$

- Fra første likning ser vi at vi må la $x_2 \leq 3$ for ellers blir w_1 negativ. Videre, andre og tredje likning gir hhv. begrensningene $2 - x_2 \geq 0$ og $6 - 2x_2 \geq 0$, som gir $x_2 \leq 2$ og $x_2 \leq 3$.
- For å sikre at ingen av basisvariablene blir negative, vil vi nå øke x_2 til 2, som svarer til det strengeste kravet vi fikk fra de tre likningene.

Detaljer 3

- ▶ Men når vi øker x_2 får basisvariablene nye verdier, nemlig

$$w_1 = 3 - x_2, \quad w_2 = 2 - x_2, \quad w_3 = 6 - 2x_2$$

- ▶ så når $x_2 = 2$ blir $w_1 = 1$, $w_2 = 0$ og $w_3 = 2$.
- ▶ Det var w_2 som ble 0 fordi det strengeste kravet var i andre likning.

Detaljer 3

- ▶ Men når vi øker x_2 får basisvariablene nye verdier, nemlig

$$w_1 = 3 - x_2, \quad w_2 = 2 - x_2, \quad w_3 = 6 - 2x_2$$

- ▶ så når $x_2 = 2$ blir $w_1 = 1$, $w_2 = 0$ og $w_3 = 2$.
- ▶ Det var w_2 som ble 0 fordi det strengeste kravet var i andre likning.
- ▶ Vi skriver nå om andre likning slik at x_2 uttrykkes ved hjelp av de øvrige variablene. Dette gir

$$x_2 = 2 - x_1 - w_2.$$

- ▶ Vi får et ekvivalent likningssystem ved å erstatte andre likning med den nye formen og erstatte x_2 med $2 - x_1 - w_2$ i de to øvrige likningene og i objektivfunksjonen.

Pivoting: omforming av systemet

“Mini-algebra” gir

$$\begin{array}{rclclclcl}
 \xi & = & 8 & - & x_1 & - & 4w_2 & + & x_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 1 & - & x_1 & + & w_2 & - & x_3 \\
 x_2 & = & 2 & - & x_1 & - & w_2 & & \\
 w_3 & = & 2 & & & + & 2w_2 & - & 3x_3
 \end{array}$$

- ▶ Dette er vår nye basisliste,
- ▶ Regneoperasjonene vi har gjort kalles en **pivoting**.

Pivoting - generelt

- ▶ nn pivoting er altså en omforming av likningssystemet ved at en ny variabel kommer inn i basis og en annen variabel går ut av basis.
- ▶ **basis** er mengden av basisvariable (egentlig er det variabelnummerne)
- ▶ regneoperasjonene i en pivoting svarer til elementære radoperasjoner for lineære likninger.
- ▶ derfor: gammelt og nytt system ekvivalent, dvs. samme løsningene

Ny pivotering i eksemplet

$$\begin{array}{rclclcl}
 \xi & = & 8 & - & x_1 & - & 4w_2 & + & x_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 1 & - & x_1 & + & w_2 & - & x_3 \\
 x_2 & = & 2 & - & x_1 & - & w_2 & & \\
 w_3 & = & 2 & & & + & 2w_2 & - & 3x_3
 \end{array}$$

- ▶ ny basisløsning er $w_1 = 1$, $x_2 = 2$, $w_3 = 2$ og $x_1 = w_2 = x_3 = 0$, og objektivfunksjonen er $\xi = 8$.
- ▶ Vi har altså funnet en bedre løsning og klart å øke ξ fra 0 til 8.
- ▶ kan øke ξ mer!
- ▶ ser at en økning av x_3 vil gi høyere ξ .
- ▶ Så vi velger å ta x_3 inn i basis.
- ▶ Hvor mye kan vi øke x_3 ?

Ny piv. forts.

- ▶ Når x_3 økes (mens de andre to ikkebasisvariablene x_1 og w_2 holdes fast lik 0) vil basisvariablene w_1 og w_3 avta, mens basisvariabelen x_2 ikke endres.
- ▶ Vi kan øke x_3 til $2/3$, og da blir w_3 lik 0.
- ▶ Vi gjennomfører derfor en pivotering ved å ta x_3 inn i basis og w_3 ut av basis. Ved å skrive om basislikingen for w_3 og gjennomføre eliminasjonen får vi

Ny piv. forts.

- ▶ Når x_3 økes (mens de andre to ikkebasisvariablene x_1 og w_2 holdes fast lik 0) vil basisvariablene w_1 og w_3 avta, mens basisvariabelen x_2 ikke endres.
- ▶ Vi kan øke x_3 til $2/3$, og da blir w_3 lik 0.
- ▶ Vi gjennomfører derfor en pivotering ved å ta x_3 inn i basis og w_3 ut av basis. Ved å skrive om basislikingen for w_3 og gjennomføre eliminasjonen får vi

$$\begin{array}{rclclcl}
 \xi & = & 26/3 & - & x_1 & - & (10/3)w_2 & - & (1/3)w_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 1/3 & - & x_1 & + & (1/3)w_2 & + & (1/3)w_3 \\
 x_2 & = & 2 & - & x_1 & - & w_2 & & \\
 x_3 & = & 2/3 & & & + & (2/3)w_2 & - & (1/3)w_3
 \end{array}$$

Avslutning

$$\begin{array}{rclclcl}
 \xi & = & 26/3 & - & x_1 & - & (10/3)w_2 & - & (1/3)w_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 1/3 & - & x_1 & + & (1/3)w_2 & + & (1/3)w_3 \\
 x_2 & = & 2 & - & x_1 & - & w_2 & & \\
 x_3 & = & 2/3 & & & + & (2/3)w_2 & - & (1/3)w_3
 \end{array}$$

- alle ikkebasisvariablene har ikkepositiv koeffisient i objektivfunksjonen

Avslutning

$$\begin{array}{rclclcl}
 \xi & = & 26/3 & - & x_1 & - & (10/3)w_2 & - & (1/3)w_3 \\
 \hline
 w_1 & = & 1/3 & - & x_1 & + & (1/3)w_2 & + & (1/3)w_3 \\
 x_2 & = & 2 & - & x_1 & - & w_2 & & \\
 x_3 & = & 2/3 & & & + & (2/3)w_2 & - & (1/3)w_3
 \end{array}$$

- ▶ alle ikkebasisvariablene har ikkepositiv koeffisient i objektivfunksjonen
- ▶ **OPTIMAL LØSNING !!!!**
- ▶ Fordi: enhver annen løsning fremkommer ved at ikkebasisvariablene økes (minst én av dem) og da blir verdien på objektivfunksjonen lavere.
- ▶ Optimal løsning er $w_1 = 1/3$, $x_2 = 2$, $x_3 = 2/3$, $x_1 = 0$, $w_2 = 0$, $w_3 = 0$.
- ▶ Faktisk: dette må være en *unik* optimal løsning fordi ...

Litt mer: LP på andre former

- ▶ Alle LP problemer kan skrives om til **standardformen** der vi har: maksimering, $\leq$ ulikheter, og ikke-negative variable.
- ▶ minimere f.eks. $2x_1 - 3x_2$ under visse krav, er dette ekvivalent med å maksimere den negative av funksjonen, dvs. $-2x_1 + 3x_2$.
- ▶ $\geq$ ulikheter kan konverteres til $\leq$ ulikheter ved å multiplisere med -1 .
- ▶ hver likning kan erstattes med to ulikheter, én hver vei. F.eks. erstattes $2x_1 + 5x_2 = 4$ med $2x_1 + 5x_2 \leq 4$, $-2x_1 - 5x_2 \leq -4$.
- ▶ I LP programsystemer gjøres omskrivninger i koden slik at bruker slipper å tenke på disse konverteringene.

Startløsning

- ▶ Hvordan finne en startløsning?

Startløsning

- ▶ Hvordan finne en startløsning?
- ▶ hvis standardform: en startløsning ved å la alle slakkvariablene være basisvariable.
- ▶ Da er $x_1 = x_2 = \dots = 0$, og slakkvariablene er lik de respektive høyresidene i ulikhetene. OK når disse er ≥ 0 .
- ▶ hva hvis $b_i < 0$ for minst en i ?

Startløsning

- ▶ Hvordan finne en startløsning?
- ▶ hvis standardform: en startløsning ved å la alle slakkvariablene være basisvariable.
- ▶ Da er $x_1 = x_2 = \dots = 0$, og slakkvariablene er lik de respektive høyresidene i ulikhetene. OK når disse er ≥ 0 .
- ▶ hva hvis $b_i < 0$ for minst en i ?
- ▶ Kan stille opp **Fase 1 problemet**: dette er et nytt LP problem med en ekstra variabel som representerer et tillegg på høyresiden
- ▶ man får ulikheter $\dots \leq b_i + z$, så lett å finne en startløsning her (bruk z stor nok!)
- ▶ løser Fase 1 med simpleksalgoritmen. Resultatet er en startløsning (dersom det i det hele tatt finnes) som brukes til å starte simpleksalgoritmen på den egentlige LP problemet.

Sirkling

- ▶ Det kan tenkes at simpleksalgoritmen ikke avsluttes.
- ▶ **Sirkling**: gjentatte pivoteringer der verdien på objektivfunksjonen er den samme, for så vende tilbake til en basis man har besøkt tidligere.
- ▶ erfaring viser at dette ikke er noe praktisk problem.
- ▶ Men det er en teoretisk mulighet, eks. på sirkling er konstruert.
- ▶ man har (heldigvis) funnet teknikker (pivoteringsregler) som garantert unngår slik sirkling.

LP fundamentalteoremet

Vi avslutter med et teorem som kalles **fundamentalteoremet for lineær programmering**.

LP fundamentalteoremet

Vi avslutter med et teorem som kalles **fundamentalteoremet for lineær programmering**.

Teorem: *Dersom et LP problem har en tillatt løsning, så har det også en tillatt basisløsning.*

Dersom et LP problem har en optimal løsning, så har det også en optimal basisløsning.

Dette resultatet kan utledes fra en analyse av simpleksmetoden, ved å vise at den avsluttes etter et endelig antall pivoteringer, og da med en optimal løsning, evt. vises at problemet ikke har noen tillatt løsning eller ubegrenset optimal verdi.

Program demo.

- ▶ **Pivoteringsverktøy.** R. Vanderbei har skrevet en utmerket bok om LP *Linear programming*, også interessant nettside
<http://www.princeton.edu/~rvdb/LPbook/>
- ▶ demonstrer pivoteringsverktøyet til Vanderbei
- ▶ MATLAB
- ▶ TSP nettsiden



Regresjon: Hovedpunkter

- ▶ hva er regresjon
- ▶ anvendelser
- ▶ hvordan løse: normallikningene
- ▶ matriseregning
- ▶ teoretiske resultater

Hva er regresjon?

- ▶ naturvitenskap, ingeniørfag, økonomi og samfunnsfag
- ▶ studere et fenomen der ulike størrelser varierer: **finne en mest mulig presis sammenheng mellom disse størrelsene.**

Hva er regresjon?

- ▶ naturvitenskap, ingeniørfag, økonomi og samfunnsfag
- ▶ studere et fenomen der ulike størrelser varierer: **finne en mest mulig presis sammenheng mellom disse størrelsene.**
- ▶ medisin: sammenhengen mellom behandlingsmåter og forbedring i helsetilstand
- ▶ økonomi: f.eks. sammenhenger mellom økonomiske indikatorer og arbeidsløshet, eller sammenhengen mellom kostnader og produksjonsvolum i et firma. **Regresjon** er en generell metodikk for å finne slike **empiriske funksjoner** dvs. funksjoner som gir sammenhenger mellom ulike størrelser basert på data (observasjoner).

Hva er regresjon?

- ▶ naturvitenskap, ingeniørfag, økonomi og samfunnsfag
- ▶ studere et fenomen der ulike størrelser varierer: **finne en mest mulig presis sammenheng mellom disse størrelsene.**
- ▶ medisin: sammenhengen mellom behandlingsmåter og forbedring i helsetilstand
- ▶ økonomi: f.eks. sammenhenger mellom økonomiske indikatorer og arbeidsløshet, eller sammenhengen mellom kostnader og produksjonsvolum i et firma. **Regresjon** er en generell metodikk for å finne slike **empiriske funksjoner** dvs. funksjoner som gir sammenhenger mellom ulike størrelser basert på data (observasjoner).
- ▶ matematisk (statistisk) modell med visse parametre (ukjente)
- ▶ **regresjon**: **finn parameterverdier som gjør at modellen tilpasser dataene best mulig.**

Kvadratisk regresjon

- ▶ produksjonsfirma
- ▶ dataene $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ der x angir produksjonskvantum og y angir produksjonskostnad *pr. enhet*. F.eks. observasjoner påfølgende dager.

Kvadratisk regresjon

- ▶ produksjonsfirma
- ▶ dataene $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ der x angir produksjonskvantum og y angir produksjonskostnad *pr. enhet*. F.eks. observasjoner påfølgende dager.
- ▶ bruker ofte en (konveks) parabel for å beskrive sammenhengen

$$y = a + bx + cx^2 + \text{en liten feil}$$

der a , b og $c > 0$ er ukjente parametre.

- ▶ **Regresjonsproblemet:** finn verdier på a , b og c slik at

$$y_i \approx a + bx_i + cx_i^2 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n$$

- ▶ kvadratisk feil:

$$E(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - (a + bx_i + cx_i^2))^2.$$

Kvadratisk regresjon: eksempel




Figure: Konkav kvadratisk funksjon: regresjon

Regresjon – oversikt

- ▶ vi har en modell med visse ukjente parametre
- ▶ vi har visse datapunkter (observasjoner) for denne modellen
- ▶ vi vil minimere total modellfeil for observasjonene
- ▶ vi får da et optimeringsproblem som må løses.

Lineær regresjon

- ▶ datapunkter $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$
- ▶ lineær modell

$$y = a + bx$$

- ▶ minimere feilen

$$E(a, b) = \sum_{i=1}^m (y_i - (a + bx_i))^2$$

- ▶ finner da regresjonslinjen for y mhp. x

Metoden over kalles **minste kvadraters metode** (MK) fordi den totale feilfunksjonen er en sum av kvadrater. Metoden kan føres tilbake til vår venn **Carl F. Gauss**.

Multippel regresjon

- ▶ ofte vil man finne hvordan en variabel y (regresjonsvariabelen) avhenger av flere uavhengige variable, $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- ▶ kalles **multippel regresjon**
- ▶ igjen ser vi på y som en empirisk funksjon av x_i -ene, introdusere en feilfunksjon som minimeres.
- ▶ enkleste type: **lineær multippel regresjon**

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

der $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ er ukjente parametre.

- ▶ bestem optimale verdier på disse parametrene slik en total feilfunksjon (gjernes kvadratisk) minimeres.

Eks.: $y = L(x_1, x_2) + \text{feil}$

- ▶ to uavhengige variable x_1 og x_2 : bruker modellen

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$$

- ▶ datapunkter $(x_{11}, x_{12}, y_1), (x_{21}, x_{22}, y_2), \dots, (x_{m1}, x_{m2}, y_m)$.
Så den første indeksen på x angir datapunkt nummer, mens den andre indeksen angir hvilken fri variable som hører til.
- ▶ Feilfunksjonen er

$$E(\beta_0, \beta_1, \beta_2) = \sum_{i=1}^m (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2}))^2$$

- ▶ minimere mhp. parameterne β_0 , β_1 og β_2 .
- ▶ geometrisk: finn et plan i rommet slik at summen av de “vertikale” avstandene fra datapunktene til planet skal bli minst mulig.

Kommentar

Det finnes også ulineære modeller, ved å bruke f.eks. kvadratiske polynomer eller mer generelle polynomer, eksponential eller logaritme funksjoner.

Egenskaper

- ▶ Alle disse regresjonsproblemene, når vi bruker minste kvadraters metode, **kan løses ved hjelp av lineær algebra**.
- ▶ får lineære likningssystemer selv når modellen er ulineær!
- ▶ fordi modellen er lineær i de ukjente parameterne!

Egenskaper

- ▶ Alle disse regresjonsproblemene, når vi bruker minste kvadraters metode, **kan løses ved hjelp av lineær algebra.**
- ▶ får lineære likningssystemer selv når modellen er ulineær!
- ▶ fordi modellen er lineær i de ukjente parameterne!

For å se litt nærmere på dette trenger vi begrepet **matrisemultiplikasjon.**

Konsekvens: ulike typer regresjonsproblemer kan behandles under ett, felles analyse.

Matrisemultiplikasjon

Matrise:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Minner om rader og kolonner.

- **Skalarproduktet** mellom to vektorer $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ og $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ er tallet $\sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$.
- **Matriseproduktet** $C = AB$ mellom en $m \times n$ matrise A og en $n \times k$ matrise B er $m \times k$ matrisen C gitt ved at elementet i rad i og kolonne j er lik skalarproduktet mellom rad i i A og kolonne j i B , dvs.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$



Eksempel matrisemultiplikasjon

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 12 & 11 \end{bmatrix}.$$

Vi går nå inn på de grunnleggende operasjonene **addisjon** og **multiplikasjon med skalar** for matriser. Dette vil bli brukt under for å formulere og løse regresjonsproblemer. De nevnte operasjonene foregår komponentvis, f.eks.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Legg merke til at addisjon av matriser bare har mening når matrisen has samme størrelse.

Lineære likninger – igjen

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & & & \vdots & & & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

På matrisiform kan dette skrives enkelt som

$$Ax = b$$

der A er koeffisientmatrisen, x vektoren med de ukjente, og b vektoren med høyresidene

Lineære likninger – igjen

$$Ax = b$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

- ▶ x og b kolonnevektorer (matriser med én kolonne)
- ▶ matriseproduktet Ax er en kolonnevektor og $(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$.
- ▶ matriselikningen $Ax = b$ betyr at de to matrisene Ax og b er like komponent for komponent dvs.
- ▶ $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ for $i = 1, 2, \dots, m$.

Lineære likninger – igjen

...forøvrig er løsningen av $Ax = b$ lik

$$x = A^{-1}b$$

hvis ...

Regneregler

Regneregler for matriser (matrisealgebra):

- ▶ $A(BC) = (AB)C$
- ▶ $A(B + C) = AB + AC$ og $(A + B)C = AC + BC$

Dette betyr at man kan **regne med matriser**.

NB: $AB = BA$ holder ikke generelt!

Den **transponerte** A^T av en matrise A : i 'te rad i A^T er i 'te kolonne i A .

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Tilbake til regresjon

- ▶ lineær regresjon med én uavhengig variabel

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

- ▶ innfører matriser

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

- ▶ Vektoren $e = y - X\beta$ vil da ha komponenter $e_i = y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)$ så dette er feilvektoren.
- ▶ Ved minste kvadraters metode vil vi minimere

$$\sum_{i=1}^m e_i^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$$

Tilbake til regresjon

Dette er det samme som $\|e\|^2$ der $\|e\|$ kalles **lengden**, eller **normen**, til vektoren e og er definert som

$$\|e\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m e_i^2}$$

Regresjonsproblemet blir da:

- ▶ minimér $\|y - X\beta\|^2$, ekvivalent minimér $\|y - X\beta\|$, over alle vektorer $\beta \in \mathbb{R}^2$.

Løsning

Kan vise (ved noe analyse) at β er en løsning av dette MK problemet hvis og bare hvis β er en løsning av følgende lineære likningssystem

$$X^T X \beta = X^T y.$$

Dette systemet kalles **normallikningene**.

Eksempel

Vi skal finne regresjonslinjen for punktene $(1, 1)$, $(3, 2)$ og $(4, 5)$.
Her er $m = 3$ og

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

som gir

$$X^T X = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 8 & 26 \end{bmatrix}, \quad X^T y = \begin{bmatrix} 8 \\ 27 \end{bmatrix}$$

Ved å løse normallikningene f.eks. ved Gauss eliminasjon får vi (tilnærmet) $\beta_0 = -0.5714$ og $\beta_1 = 1.2143$.

Kvadratisk regresjon

Kvadratisk modell med én uavhengig variabel

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2$$

De gitte datapunktene er $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$. Vi innfører følgende matriser

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

Og igjen vil minste kvadraters metode lede til at vi minimerer (kvadratet av) normen til feilvektoren

$$y - X\beta$$

Kvadratisk regresjon

som jo har komponenter $y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2})$. Dette problemet løses ved å løse **normallikningene**

$$X^T X \beta = X^T y.$$

Dette er et 3×3 lineært likningssystem som f.eks. kan løses ved Gauss eliminasjon.

Forresten, i matematisk programvare for regresjon, brukes ikke Gauss eliminasjon for slike problemer, men istedet den såkalte **QR-metoden**. Dette er en metode som er mer robust overfor avrundingsfeil.

Multipel regresjon

Til slutt ser vi på **multipel regresjon** der vi har modellen

$$y = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$$

og datapunkter $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}, y_i)$ for $i = 1, 2, \dots, m$. Vi innfører matrisene

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}.$$

Vi betrakter minste kvadaters problemet der vi vil minimere kvadratfeilen

$$\|y - X\beta\|^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - \sum_{j=1}^n x_{ij}\beta_j)^2$$

Multipel regresjon

Følgende teorem sier oss hvordan dette problemet løses.

Multipel regresjon

Følgende teorem sier oss hvordan dette problemet løses.

Teorem: *En vektor β minimiserer kvadratfeilen over hvis og bare hvis β er løsning av normallikningene*

$$X^T X \beta = X^T y.$$

Dette systemet har alltid en løsning, og løsningen er entydig hvis kolonnene i X er lineært uavhengige.

Bevis – skisse

- ▶ kvadratfeilen er en konveks kvadratisk funksjon f i n variable. For slike funksjoner vet man fra analyse (konveks optimering) at et punkt β er (absolutt, globalt) minimum for funksjonen f hvis og bare hvis alle partielle deriverte er null i punktet. (Den partiell deriverte i et punkt mhp x er vanlig derivert av funksjonen når alle de andre variablene holdes konstant.)
- ▶ Siden vår feilfunksjon f er kvadratisk gir denne derivasjonen at visse lineære funksjoner skal være null, og dette gir normallikingene ved noe regning.
- ▶ For detaljer, se f.eks. Lay *Linear algebra*. Kan også vises ved hjelp av teori for ortogonalitet i vektorrom og “flerdimensjonal Pythagoras”.

Vekstmodeller: Hovedpunkter

- ▶ vekstmodeller
- ▶ eksponentiell vekst
- ▶ logistisk vekstmodell
- ▶ løsning og beregning

Vekstmodeller og differensialligninger

- ▶ ser på et par enkle vekstmodeller
- ▶ del av fagfeltet **differensialligninger**
- ▶ dynamiske (tidsvarierende) problemer, løsningen en funksjon av tiden
- ▶ overalt i **naturvitenskap, teknikk og økonomi**
- ▶ vekstmodeller: biologi, økonomi

En enkel modell

- ▶ modell som beskriver vekst av populasjoner i biologi.
- ▶ populasjon av en viss dyreart i et avgrenset geografisk område
- ▶ vil finne størrelsen på denne populasjonen (antall) over tid.
- ▶ variabel er $N(t)$: antall individer ved tidspunkt t
- ▶ N er en funksjon av tiden, tenker oss denne (som forenkling) deriverbar og derfor kontinuerlig
- ▶ populasjonens **vekstrate** er den deriverte av N altså $\frac{dN}{dt}$, eller $N'(t)$.

En enkel modell

- den **relative vekstraten** er vekstraten dividert med populasjonsstørrelsen

$$\text{relativ vekstrate} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dt}$$

Så hvis populasjonen vokser fra 200 ved tidspunkt år t til 250 i år $t + 1$, så vekstraten (ca.) $(250 - 200)/1 = 50$ og den relative vekstraten blir $50/200 = 0.25$.

En enkel modell

- den enkleste modellen er at **alle forhold som bestemmer relativ vekst er konstante over tid**. Dette betyr at den relative vekstraten også blir konstant, altså

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = a$$

- da må N være gitt ved

$$N = N_0 e^{at}.$$

for en konstant N_0 som er populasjonen ved $t = 0$. Dette er en **eksponentialfunksjon**, og vi har eksponentiell vekst.

En enkel modell

- den enkleste modellen er at **alle forhold som bestemmer relativ vekst er konstante over tid**. Dette betyr at den relative vekstraten også blir konstant, altså

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = a$$

- da må N være gitt ved

$$N = N_0 e^{at}.$$

for en konstant N_0 som er populasjonen ved $t = 0$. Dette er en **eksponentialfunksjon**, og vi har eksponentiell vekst.

Modellen over er en såkalt (enkel) **lineær differensialligning av første orden**, $y' = ay$, og ved integralregning kan man vise at enhver løsning er en eksponentialfunksjon $y = be^{at}$, se f.eks. Gulliksen *Matematikk i praksis*.

Kommentarer

- ▶ vekstmodellen over ga eksponentiell vekst
- ▶ bygde på den forenklete antakelsen at vekstforholdene var uforandret over tid.
- ▶ i praksis vil jo vekstforholdene variere
- ▶ for eksempel, vi må regne med at den relative vekstraten i befolkningen i f.eks. Sør-Korea vil gå ned når landet begynner å bli svært tettbefolket (og f.eks. arbeidsmuligheter er redusert).
- ▶ ... eller at et lands økonomi ikke vokser til himmels
- ▶ flere ulike vekstmodeller er aktuelle, avhengig av antakelser om vekstforhold og kopling til rammevilkår.

Den logistiske vekstmodellen

- ▶ neste modell: den **logistiske vekstmodellen**.
- ▶ utvider den enkle modellen
- ▶ tar hensyn til at **når populasjonen nærmer seg et visst metningspunkt så vil den relative vekstraten gå mot null**
- ▶ i startfasen: økende vekst av populasjonen,
- ▶ deretter: veksten flater ut og populasjonen nærmer seg metningspunktet.

Den logistiske vekstmodellen

- ▶ la K være en gitt *bærekapasitet* (metningspunkt), maks. antall individer som kan leve i det angitte området.
- ▶ N populasjonens størrelse og $K - N$ blir da “ledig kapasitet”
- ▶ i den logistiske vekstmodellen antar man at den relative vekstraten er proporsjonal med ledig kapasitet, altså

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = a(K - N)$$

- ▶ her er a en gitt positiv konstant.
- ▶ modellen også kan skrives som

$$\frac{dN}{dt} = aN(K - N).$$

Den logistiske vekstmodellen

$$\frac{dN}{dt} = aN(K - N).$$

- ▶ høyresiden i den logistiske modellen en kvadratisk funksjon av N : denne funksjone har nullpunkter $N = 0$ og $N = K$ og er konkav (krummer nedover).
- ▶ når N er svært liten i forhold til K , så er høyresiden tilnærmet lik aNK som vi vet gir eksponentiell vekst. Så i startfasen får vi (tilnærmet) eksponentiell vekst.
- ▶ .. og når N er nær K vil veksten flate ut

Løsning

Neste teorem gir løsningen av den logistiske modellen. (De konstante funksjonen null eller K er også løsning, som vi ser bort fra under.)

Løsning

Neste teorem gir løsningen av den logistiske modellen. (De konstante funksjonen null eller K er også løsning, som vi ser bort fra under.)

Teorem: *Den generelle (ikke-trivielle) løsningen av den logistiske vekstmodellen er*

$$N(t) = \frac{K}{1 + ce^{-aKt}}$$

der c er en vilkårlig konstant.

- ▶ modellen er en såkalt separabel diff. likning og kan løses ut fra generelle metoder for slike likninger
- ▶ en øvingsoppgave å vise at funksjonen over virkelig er en løsning av likningen. Dette kan da sjekkes ved derivasjon (der man kan benytte kjerneregelen).

Eksempel

Betrakt den logistiske modellen der $a = 0.1$ og $K = 200$. Anta at størrelsen på populasjonen ved $t = 0$ er $N_0 = 40$. Vi måler tiden i antall år. Hva er løsningen N ? Fra teoremet har vi at

$$N(t) = \frac{200}{1 + ce^{-20t}}$$


er den generelle løsningen. Her kan vi bruke initialbetingelsen $N(0) = N_0 = 40$ til å bestemme konstanten c . Vi får

$$40 = \frac{200}{1 + ce^{-20 \cdot 0}} = \frac{200}{1 + c}$$

så $c = 200/40 - 1 = 4$. Altså er løsningen

$$N(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-20t}}.$$

Eksempel



Eksempel

La oss også se hva som ville skje hvis initialbetingelsen var $N_0 = 400$, som altså er større enn bærekapasiteten $K = 200$. Da får vi

$$400 = \frac{200}{1 + c}$$

som gir $c = 200/400 - 1 = -1/2$. Løsningen er da

$$N(t) = \frac{200}{1 - (1/2)e^{-20t}}.$$

Vi ser at når tiden går mot uendelig vil $N(t)$ nærme seg bærekapasiteten 200. F.eks. etter 1 måned er populasjonene størrelse $N(1/12) = 220$.

Videre lesning

- ▶ Gulliksen, T., 1988. *Matematikk i praksis*. Universitetsforlaget, 2004 (1. utgave 1981).
- ▶ Johnson, L.W., Riess, R.D. and Arnold, J.T., 1998. *Introduction to linear algebra*, Addison-Wesley.
- ▶ Lay, D., 2000 *Linear algebra and Its Applications*, Addison-Wesley.
- ▶ Lindstrøm, T., *Kalkulus*, 3.utgave, Universitetsforlaget, Oslo, 2006
- ▶ Vanderbei, R.J., 1996 *Linear programming: foundations and extensions*, Kluwer.

Studier man bør merke seg !!!!

... kan anbefales gode elever som liker matematikk, og gjerne vil knytte det til andre fag

- ▶ Matematikk, informatikk og teknologi:
<http://www.uio.no/studier/program/mit>
- ▶ **Nyhet:** Matematikk og økonomi:
<http://www.uio.no/studier/program/matokon> (tilgjengelig tidlig januar), se også linken under for mer informasjon om studiet
- ▶ nettressurser i temaene her, se <http://folk.uio.no/geird>