

Dobbeltstokastiske matriser  
og  
polytoper  
og  
majorisering

*Geir Dahl*

*Norsk matematisk forening  
29. mars 2001*

Plan:

- dobbeltstokastiske matriser
- transportproblemet, polyedre
- Birkhoff polytopen
- majorisering: begrep og noen resultater
- Robin Hood !
- et par anvendelser
- egne bidrag

### Mål:

- gi et lite innblikk i feltet ved å presentere noen sentrale begreper og resultater
- unngå tekniske ting
- vekt på tidlige resultater

## Stokastiske og dobbeltstokastiske matriser

Stokastisk matrise:

- **IKKE:** matrise som er en stokastisk variabel
- En stokastisk matrise er en  $m \times n$  matrise som er ikke-negativ og der alle radsummer er 1

$$M = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0 & 0.5 \\ 0.6 & 0.3 & 0 & 0.1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- Markov matrise
- Markov kjeder, statistiske eksperimenter

Dobbeltstokastisk matrise: en ikke-negative matrise der alle rad- og kolonnesummer er 1. Må være kvadratisk.

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0 & 0.5 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- Romanovsky (1935): *stokastisk*
- Feller (1950): *dobbeltstokastisk*
- bistokastisk, Schur transformasjon

## Noen klasser av dobbeltstokastiske matriser

- Matrisen av orden  $n$  med alle elementer lik  $1/n$ .
- **Permutasjonsmatriser**: kvadratisk  $(0, 1)$ -matrise der hver linje (rad eller kolonne) inneholder nøyaktig én 1'er.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Det er  $n!$  permutasjonsmatriser.

- **Ortostokastiske matriser**:  $A = [a_{i,j}]$  der  $a_{i,j} = q_{i,j}^2$  og  $Q = [q_{i,j}]$  er ortogonal. (Tilsvarende for  $Q$  unitær.)
- **Sirkulantmatriser (visse)**:

$$\begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_0 \end{bmatrix}$$

der  $c$  er stokastisk (dvs.  $c$  ikke negativ og med sum 1).

- **Latinske kvadrater (visse)**

## Et sentralt resultat

Teorem. [*Birkhoff (1946), von Neumann (1953)*]:

En matrise  $A$  er dobbeltstokastisk hvis og bare hvis  $A$  kan skrives som en konveks kombinasjon av permutasjonsmatriser:

Altså:

$$A = \sum_{j=1}^N \lambda_j P_j$$

der  $P_1, \dots, P_N$  er permutasjonsmatriser og

$$\lambda_j \geq 0 \quad (j \leq N), \quad \sum_{j=1}^N \lambda_j = 1.$$

Birkhoff's teorem er et eksempel på et dekomposisjonsteorem for matriser.

Eksempel.

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.7 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} =$$

$$0.3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 0.2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Skal snart:

- mengden av dobbeltstokastiske matriser: geometri
- se på et bevis for Birkhoff's teorem
- hvor mange permutasjonsmatriser kan vi klare oss med?

## Transportproblemet

En enkel optimeringsmodell for transport.

Gitt:

- $m$  lagre  $i = 1, 2, \dots, m$
- $n$  kunder  $j = 1, 2, \dots, n$
- lager  $i$  har  $a_i$  enheter av en vare
- kunde  $j$  ønsker  $b_j$  enheter av varen
- det koster  $c_{i,j}$  kr pr. varenhet som fraktes fra lager  $i$  til kunde  $j$

Finn en transportplan, dvs. hvor mye som skal fraktes fra hver kunde til hvert lager, slik at

- alle behov dekkes og lagerkapasiteter overholdes og
- slik at den totale transportkostnad er minst mulig.

Må ha  $\sum_i a_i \geq \sum_j b_j$  og kan faktisk anta likhet her:

$$\sum_i a_i = \sum_j b_j$$

Da benytttes hver lagerkapasitet fullt ut.

Formulerer transportproblemet som et **lineær optimeringsproblem**:

minimer  $\sum_{i,j} c_{i,j} \mathbf{x}_{i,j}$   
forutsatt at

$$(i) \quad \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_{i,j} = a_i \quad (i \leq m)$$

$$(ii) \quad \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_{i,j} = b_j \quad (j \leq n)$$

$$(iii) \quad \mathbf{x}_{i,j} \geq 0 \quad (i \leq m, j \leq n).$$

En løsning  $\mathbf{x}$  her kan vi oppfatte som en  $m \times n$  matrise. En **tillatt løsning (matrise)** oppfyller kravene (i), (ii) og (iii).

Altså: **de tillatte løsningene er ikke-negative  $m \times n$  matriser med radsummer  $a_1, a_2, \dots, a_m$  og kolonnesummer  $b_1, b_2, \dots, b_n$ . Disse utgjør en mengde  $\mathcal{T}$  i  $\mathbb{R}^{m \times n}$ .**

Hvis  $m = n$  og hver  $a_i$  og hver  $b_i$  er lik 1, vil  $\mathcal{T}$  være mengden av alle dobbeltstokastiske matriser.

Hva kan vi si om generelt om strukturen til  $\mathcal{T}$ ?

Algoritme for transportproblemet?

Men hvor blir det av

ROBIN HOOD

????

## Litt om Polytoper og polyedre

Et **polyeder**  $P$  (i  $\mathbb{R}^n$ ) er løsningsmengden til et system av endelig mange lineære ulikheter:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

der  $A$  er en  $m \times n$  matrise og  $b \in \mathbb{R}^m$  (og  $\leq$  betyr komponentvis  $\leq$ ). Altså: snitt mellom endelig mange **halvrom**

$$\{x \in \mathbb{R}^n : d_1 x_1 + \cdots + d_n x_n \leq c\}.$$

Polyedre er spesielle **konvekse mengder**.

En **polytop**  $Q$  (i  $\mathbb{R}^n$ ) er den konvekse innhylningen til en endelig mengde:

$$Q = \text{conv}(\{y_1, y_2, \dots, y_r\})$$

Så:  $Q$  består av alle mulige konveks kombinasjoner av vektorene (punktene)  $y_1, y_2, \dots, y_r$ .

Ekvivalent:  $Q$  er snittet av alle konvekse mengder som inneholder  $y_1, y_2, \dots, y_r$ .

**Teorem.** [*Weyl (1935) Minkowski (1896)*]: En mengde  $P$  er en polytop hvis og bare hvis  $P$  er et begrenset polyeder.

**Generalisering:** [*Motzkin (1936)*]:


**polyeder = polytop + endelig generert konveks kjegle.**

La  $P$  være et polyeder. Da kalles  $x \in P$  et **ekstrempunkt** i  $P$  hvis  $x$  ikke er midtpunkt mellom to andre punkter i  $P$ .

Dermed: **en polytop er den konvekse innhylningen av sine ekstrempunkter.**

(Krein-Milman: tilsvarende for kompakte konvekse mengder)


## Dodekaeder



Euler's polyederformel:  $v - e + f = 2$

- $v = 20$  ekstrempunkter (hjørner)
- $e = 30$  kanter
- $f = 12$  fasetter

# Permutaeder




## Birkhoff polytopen

$$\Omega_n = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A \text{ er dobbeltstokastisk}\}$$

Begrenset polyeder og derfor polytop. *Skal finne ekstrempunktene.*

**Observasjon:** de *heltallige* dobbeltstokastiske matrisene er permutasjonsmatrisene. Så: nok å vise at ethvert ekstepunkt i  $\Omega_n$  er heltallig.

Anta  $A$  ikke heltallig. Definer en bipartitt graf med noder  $u_1, \dots, u_n$  og  $v_1, \dots, v_n$  og **en kant**  $[u_i, v_j]$  hvis  $0 < a_{i,j} < 1$ .





$$A = (1/2)(A + \epsilon D) + (1/2)(A - \epsilon D)$$

Dette viser Birkhoff's teorem.

Tilsvarende får vi at **ekstrempunktene i transportpolytopen  $\mathcal{T}$**  svarer til (visse) delgrafer av  $G$ , nemlig spenntrær (sammenhengende og utspenner alle nodene, og ingen syklus).

Dette gir den **kombinatoriske strukturen** til ekstrempunktene, selv om man ikke finner dem eksplisitt.





$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & & \\ & & 1 & & \\ & 2 & & & 3 \\ & & 2 & 1 & \\ & & & 2 & \end{bmatrix}$$

Dette gir strukturen til  $\mathcal{T}$  og kan brukes til å gi en **effektiv algoritme for transportproblemet**. (Basert på dualitetsteori. Faktisk kan duale variable, én for hver node i grafen, beregnes fra spenntreet på en enkel måte.)

Tilbake til Birkhoff polytopen  $\Omega_n$ :

La  $A \in \Omega_n$ . Så  $A = \sum_{j=1}^N \lambda_j P_j$ .

**Hvor liten kan  $N$  velges?**

$$N \leq (n - 1)^2 + 1$$

**Birkhoff algoritmen:** finner en dekomposisjon.

**Carathéodory's teorem.**

Har noen sett noe til

ROBIN HOOD

????

## Majorisering

Majorisering er en (pre-)ordning av vektorer som er nært knyttet til dobbeltstokastiske matriser.

La  $x$  og  $y$  være to vektorer i  $\mathbb{R}^n$  og la  $x_{[j]}$  betegne  $j$ 'te største komponent i  $x$ . Så  $x_{[1]} \geq x_{[2]} \geq \dots \geq x_{[n]}$ .

Vi sier at  $x$  er **majorisert** av  $y$  dersom

$$\sum_{j=1}^k x_{[j]} \leq \sum_{j=1}^k y_{[j]} \quad (k \leq n-1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_j = \sum_{j=1}^n y_j$$


og vi skriver  $x \prec y$ .

Så  $\prec$  er binær relasjon på  $\mathbb{R}^n$  og

- **preordning**: (i)  $x \prec x$ , (ii)  $x \prec y$ ,  $y \prec z$  medfører  $x \prec z$ .
- **permutasjonsinvariant**: hvis  $x \prec y$  så er også enhver permutasjon av  $x$  majorisert av enhver permutasjon av  $y$ .
- ikke partiell ordning på  $\mathbb{R}^n$
- **men partiell ordning på restriksjon**  
 $\{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq x_2 \geq \dots x_n\}$ . Faktisk: **lattice**.

## Diagram: Lorentz kurve

Lineær interpolant til punktene  $(k, \sum_{j=1}^k x_{[j]})$  for  $k = 1, 2, \dots, n$ .



$x \prec y$  hvis Lorentz kurven til  $x$  ligger under Lorentz kurven til  $y$ .

I økonomi: majorisering brukt til å måle ulikhet i **inntektsfordelinger i populasjoner**. Lorentz (1905).

Lattice-operasjonene kan tolkes i diagrammet.

Karakteriseringer av  $x \prec y$ ?

Teorem. [Hardy, Littlewood, Polya (1929)]:  $x$  er majorisert av  $y$  hvis og bare hvis det fins en dobbeltstokastisk matrise  $A$  slik at

$$x = Ay$$

Hvorfor?

Observasjon: For gitt vektor  $y$  er mengden

$$\{z : z \prec y\}$$

konveks. Faktisk et polyeder (hvorfor?).

Hvis  $A$  er dobbeltstokastisk, så er pga. Birkhoff's teorem  $A$  en konveks kombinasjon av permutasjonsmatriser

$$A = \sum_j \lambda_j P_j$$

Så hvis  $x = Ay$  blir

$$x = \left( \sum_j \lambda_j P_j \right) y = \sum_j \lambda_j (P_j y)$$

Men  $P_j y \prec y$  og  $\{z : z \prec y\}$  er konveks, så da må  $x \prec y$ .

Hva med omvendingen?

## Endelig: Robin Hood !!!!!!!

Repetisjon: *Ta fra de rike og gi til de fattige!*

**Robin Hood transformasjon:** La  $Q$  være permutasjonsmatrisen til en transposisjon (bytter to koordinater) og la  $0 \leq \lambda \leq 1$ . Kaller

$$T = \lambda I + (1 - \lambda)Q$$

en **Robin Hood transformasjon** (eller  $T$ -transform).

Merk:  $T$  er dobbeltstokastisk. Og  $T$  ligger på en kant som er nabo med hjørnet  $I$  i Birkhoff polytopen.

$$\begin{aligned} x &= (x_1, x_2, x_3, x_4) \\ Tx &= (x_1, (4/5)x_2 + (1/5)x_4, x_3, (4/5)x_4 + (1/5)x_2) \end{aligned}$$

De nye komponentene vil være nærmere hverandre.

Som vist:  $Tx \prec x$ .

**Anta  $x \prec y$**  og at  $x, y$  begge er ikkevoksende. Velg  $j$  maximal med  $x_j < y_j$  og velg  $k > j$  minimal med  $x_k > y_k$ . Så

$$y_j > x_j \geq x_k > y_k$$

Robin Hood transformasjon: overføre mest mulig fra  $y_j$  til  $y_k$ , men slik at resultatet  $y^*$  oppfyller  $x \prec y^*$ .

Så

$$x < y^* < y.$$

og enten er  $y_j^* = x_j$  eller så er  $y_k^* = x_k$ . Kan gjenta prosessen og etter høyst  $n - 1$  iterasjoner har vi kommet til  $x$ .

Har vist: Hvis  $x < y$ , så kan  $x$  nåes fra  $y$  ved et endelig antall (faktisk  $\leq n - 1$ ) Robin Hood transformasjoner.

Og teoremet til Hardy, Littlewood, Polya (1929) følger da. Fordi produktet av dobbeltstokastiske matriser er dobbeltstokastisk.

Teorem. [Schur (1929), Hardy, Littlewood, Polya (1929)]  
 $x$  er majorisert av  $y$  hvis og bare hvis for hver konveks funksjon  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  så holder

$$\sum_{j=1}^n g(x_j) \leq \sum_{j=1}^n g(y_j)$$

Eksempel:  $g(x) = -\log(x)$  gir  $(1/n) \sum_i x_i \geq \prod_i x_i^{1/n}$ :  
aritmetisk-geometrisk ulikhet.

En funksjon  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  kalles **Schur-convex** hvis

$$x \prec y \Rightarrow \phi(x) \leq \phi(y)$$

Ved å vise en viss majorisering og velge en passende Schur-convex funksjon kan man få interessante ulikheter. Se Marshall, Olkin: “Inequalities: Theory of Majorization and its applications” (1979).

**Anvendelse i spektralteori:** sammenheng mellom diagonalelementer og egenverdier.

**Teorem.** [Schur (1923)] La  $H$  være en reell symmetrisk (evt. Hermittisk) matrise med diagonal elementer  $h_1, h_2, \dots, h_n$  og egenverdier  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ . Da er

$$(h_1, h_2, \dots, h_n) \prec (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

**Så:** summen av de  $k$  største diagonalelementene er høyst lik summen av de  $k$  største egenverdiene. Og  $\text{tr}H = \sum_j \lambda_j$ .

Bevis: Ved spektralteoremet er  $H = U \text{diag}(\lambda) U^T$  som gir  $h = A\lambda$  der  $A = [u_{i,j}^2]$  er dobbeltstokastisk (ortostokastisk).

**“Beste resultat”:** Omvending ved Horn (1954).

## Anvendelser innen

- **matriseteori**: egenverdier, singulære verdier
- **kombinatorikk**: f.eks eksistens at grafer med gitte grader (evt. heltallige matriser med gitte linjesummer), farvelegging av grafer, turneringer.
- **numerisk analyse**: matriseapproksimasjon
- **statistikk**: multivariabel analyse, pålitelighetsteori, køteori, fordelingsfunksjoner.
- ...

Egen innsats her: studere spørsmål knyttet til  
**majorisering og polyedre:**

- generalisering av majoriseringsbegrepet
- struktur på polyedre knyttet til en majorisering
- kombinatoriske egenskaper
- optimering over polyedre definert via majorisering
- lattice egenskaper
- dobbeltstokastiske matriser der linjene er majorisert av (evt. majoriserer) en gitt vektor

- R.A. Brualdi, G.Dahl: “Majorization-constrained doubly stochastic matrices” (2001?)
- G. Dahl, “Principal majorization ideals and optimization” (2001)
- G. Dahl, “A note on diagonally dominant matrices” (2000)
- G. Dahl, “Majorization polytopes” (1999)
- G. Dahl, “Matrix majorization” (1999)
- G. Dahl, “Majorization, polyhedra and statistical testing problems” (1998).
- G. Dahl, F. Margot, “Weak k-majorization and polyhedra”, (1998)
- G. Dahl, “Polyhedra and optimization in connection with a weak majorization ordering” (1994)

De fleste i tidsskriftet *Linear Algebra and Its Applications*.

## Generaliseringer, beslektet:

- [Erik Torgersen](#): “Comparison of statistical experiments”. Cambridge (1991). Eget kapittel om majorisering for familier av mål.
- (?) utvidelser til  $W^*$  og  $C^*$  algebraer: Alberti, Uhlmann: “Stochasticity and partial order. Doubly stochastic maps and unitary mixing”. [Erling Størmer](#): “Positive linear maps of  $C^*$ -algebras”. Springer (1974).