

1 Første ordens, kvasilineære partielle diff.ligninger

- *første orden* = bare deriverte opptil første orden forekommer
- *kvasi-lineær* = ligningen er lineær i de første-deriverte
- *partiell* = løsningen er en funksjon av flere enn én uavhengig variabel

Teorien nedenfor er illustrert for en variabel z som avhenger av to uavhengige variable, x og y , $z = z(x, y)$, men er helt generell.

Normalformen:

$$P(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + Q(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} - R(x, y, z) = 0, \quad (1)$$

- P, Q , og R avhenger ikke av $\frac{\partial z}{\partial x}$ eller $\frac{\partial z}{\partial y}$!
- $\partial z / \partial x$ og $\partial z / \partial y$ opptrer kun i første potens


En løsning av ligning 1 er en funksjon

$$z = f(x, y) \quad (2)$$

slik at

$$P(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + Q(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} - R(x, y, f(x, y)) = 0. \quad (3)$$

Funksjonen $z = f(x, y)$ definerer ei *flate* i $\mathbb{R}^3$.



Observasjon 1:

$$\mathbf{n} = \left[\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}, -1 \right] \quad (4)$$

er en *normalvektor* til flata.

Observasjon 2:

$$\mathbf{V}(x, y, z) = [P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)]. \quad (5)$$

representerer et *vektorfelt*.

Observasjon 3:

Strømlinjene til vektorfeltet, $\mathbf{r}(s) = [x(s), y(s), z(s)]$, er løsninger av


$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{V}(x, y, z), \quad (6)$$

eller utskrevet,

$$\frac{dx}{ds} = P(x, y, z), \quad \frac{dy}{ds} = Q(x, y, z), \quad \frac{dz}{ds} = R(x, y, z).$$

Observasjon 4: *Normalvektorene til en løsning av ligning 1 står ortogonalt på strømlinjene til vektorfeltet $\mathbf{V}$ definert i ligning 5:*

$$\mathbf{V} \cdot \mathbf{n} = [P, Q, R] \cdot \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1 \right] = P(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + Q(x, y, f(x, y)) \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} - R(x, y, f(x, y)) = 0! \quad (7)$$



I teorien for partielle diff.-ligninger kalles strømlinjene for *karakteristikker*.

2 Cauchyproblemet

Gitt en romkurve Γ i $\mathbb{R}^3$. Finn en funksjon $z = f(x, y)$ som tilfredsstiller ligning 1 og som er slik at Γ ligger i flata definert av løsningen.

Spesialtilfeller:

- Deler av Γ er selv en karakteristikk (Løsningen er da ikke nødvendigvis fullt ut bestemt)
- Det fins funksjoner $f(x, y)$, *singulære løsninger*, slik at vi allerede har

$$P(x, y, f(x, y)) = Q(x, y, f(x, y)) = R(x, y, f(x, y)) = 0.$$

2.1 Eksempel

Løs ligningen

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - 1 = 0 \tag{8}$$

som går gjennom romkurven

$$\mathbf{r}(t) = -\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{9}$$

Vi bestemmer karakteristikkene:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{ds} &= x, \\ \frac{dy}{ds} &= y, \\ \frac{dz}{ds} &= 1,\end{aligned}\tag{10}$$

dvs,

$$\begin{aligned}x(s) &= C_1 e^s, \\ y(s) &= C_2 e^s, \\ z(s) &= s + C_3.\end{aligned}\tag{11}$$

Anta karakteristikkene krysser romkurven for $s = 0$. Da må

$$\begin{aligned}C_1 &= -1, \\ C_2 &= 2t, \\ C_3 &= t^2,\end{aligned}\tag{12}$$

Løsningen blir definert parametrisk av

$$\begin{aligned}x &= -e^s, \\y &= 2te^s, \\z &= s + t^2,\end{aligned}\tag{13}$$

for $(s, t) \in \mathbb{R}^2$.

I dette spesielle tilfellet er det også mulig å eliminere s og t :

$$s = \ln(-x),\tag{14}$$

$$t = -\frac{y}{2x}.\tag{15}$$

Hvis vi setter dette inn i siste ligning, får vi

$$z = \ln(-x) + \left(\frac{y}{2x}\right)^2.\tag{16}$$