



Avdeling for allmenne fag

EKSAMEN

003 MATEMATIKK

06.06.02

Målform:	Bokmål/nynorsk
Sidetal:	4 + framside
Hjelpemiddel:	Kalkulator og formelsamling
Merknader:	Ingen
Vedlegg:	Ingen

Eksamensresultata blir offentliggjort på følgjande internettadresse:

<http://www-bo.hit.no/af/> Klikk t.d. "Eksamensplan/resultater"

eller du kan gå inn på Arena høgskole – da treng du ikkje kandidatnummer



Høgskolen i Telemark

EKSAMEN

06.06. 2002

(003) M A T E M A T I K K

Tid: 5 timer (09⁰⁰ - 14⁰⁰)

Sidetall: 2

Hjelpemiddel: Formelsamling og kalkulator

BOKMÅL

Oppgave 1

I denne oppgaven er funksjonen f gitt ved at: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

- a) Regn ut funksjonsverdiene for følgende argument (x -verdier): $-2, 0, 2$.
Faktoriser $f(x)$ mest mulig, og bruk dette til å avgjøre hvor funksjonen er positiv og hvor den er negativ.
- b) Finn $f'(x)$ og $f''(x)$. Bestem de intervallene der funksjonen f er voksende og der den er avtagende. Sett opp lokale ekstrepunkt og avgjør om noen er globale. Gjør rede for hvordan grafen til f krummer og finn eventuelle vendepunkt.
- c) Skisser grafen til f . Finn likningen for tangenten til grafen når $x = 0$, og merk av tangenten på graf-skissen.

Regn ut verdien A der:

$$A = \int_0^3 4 dx - \int_0^3 f(x) dx$$

A kan tolkes som arealet av et område. Merk av dette området på grafskissen.

Oppgave 2

I denne oppgaven er funksjonen g gitt ved at: $g(x) = (1+x)e^{-x}$

Bestem skjæringspunktene mellom grafen til g og koordinataksene.

Vis at $g'(x) = -xe^{-x}$ og bruk dette til å avgjøre om grafen til g har noen ekstrepunkt.

Bestem konstantene a og b slik at $G(x) = a + be^{-x} - xe^{-x}$ er en antiderivert funksjon av $g(x)$ der vi har at $G(0) = 1$.

Oppgave 3

Kari har vunnet 510 000 kr i Lotto. Premien ble utbetalt 1. januar 2002.

- a) Kari plasserte umiddelbart hele premien til 7% rente per år. Hva vil verdien av premien være henholdsvis 2 år og 4 år etter innskuddet?
Hvor lenge må premien stå urørt for at verdien skal være doblet?
Hvor mye kunne Kari ha brukt av beløpet umiddelbart da hun fikk premien, og likevel ha hatt 510 000 kr tilgjengelig igjen om 3 år så sant resten av premiebeløpet ble plassert til 7% årlig rente?
- b) Kari bestemte seg for å "leve på premien" noen år ved å sette premieutbetalingen rett i banken og så ta ut like store beløp ved utgangen av hvert år i 6 år fremover. Første utbetaling skal skje 31.12.02.
Hvor mye kan hun slik ta ut hvert år fremover så sant den årlige renta er på 7%?
Om Kari heller hadde valgt å ta ut 150 000 kr ved utgangen av hvert år fremover, hvor lenge hadde da den opprinnelige premien holdt med samme årlige rente?

Oppgave 4


Funksjonen h er gitt ved at: $h(x, y) = (y - x + 1)(y + 1) = y^2 + 2y - xy - x + 1$

- a) Finn de partielle deriverte av 1. og 2. orden for h . Vis at h har nøyaktig ett stasjonært punkt: $(0, -1)$, og klassifiser dette punktet.
- b) A er området i xy -planet som er avgrenset av trekanten med hjørner i $(0, -1)$, $(1, 0)$ og $(1, -1)$. Sidekantene er med i A . Finn minimumspunktet for h over området A .
- c) Vi definerer en ny funksjon g ved at:

$$g(x, y) = \ln(h(x, y)) = \ln((y - x + 1)(y + 1))$$

Skisser definisjonsområdet til g i xy -planet. Avgjør om g har stasjonære punkt.

Oppgave 5



Utenfor en låve skal det ved hjelp av et nettinggjerde på 360 m lages en innhengning av 3 like store rektangelforma båser, se figuren til venstre.

Nettingen skal brukes både i ytterkant av innhengningen og til skille mellom båsene. Det skal ikke være netting på sidekantene mot låveveggen.

Bestem lengdene på sidekantene x og y slik at arealet av hver "bås" blir størst mulig.



(003) M A T E M A T I K K

Tid: 5 timar (09⁰⁰ - 14⁰⁰)

Sidetal: 2

Hjelpemiddel: Formelsamling og kalkulator

NYNORSK

Oppgave 1

I denne oppgåva er funksjonen f gitt ved at: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

- a) Rekn ut funksjonsverdiane for følgjande argument (x -verdiar): $-2, 0, 2$.
Faktoriser $f(x)$ mest mogleg, og bruk dette til å avgjere kor funksjonen er positiv og kor han er negativ.
- b) Finn $f'(x)$ og $f''(x)$. Bestem dei intervalla der funksjonen f er veksande og der han er avtakande. Sett opp lokale ekstrepunkt og avgjer om nokon er globale. Gjer greie for korleis grafen til f krummar og finn eventuelle vendepunkt.
- c) Skisser grafen til f . Finn likninga for tangenten til grafen når $x = 0$, og merk av tangenten på graf-skissa.
Rekn ut verdien A der:

$$A = \int_0^3 4 \, dx - \int_0^3 f(x) \, dx$$

A kan tolkast som arealet av eit område. Merk av dette området på grafskissa.

Oppgave 2

I denne oppgåva er funksjonen g gitt ved at: $g(x) = (1+x)e^{-x}$

Bestem skjæringspunktene mellom grafen til g og koordinataksane.

Vis at $g'(x) = -xe^{-x}$ og bruk dette til å avgjere om grafen til g har noko ekstrepunkt.

Bestem konstantane a og b slik at $G(x) = a + be^{-x} - xe^{-x}$ er ein antiderivert funksjon av $g(x)$ der vi har at $G(0) = 1$.

Oppgave 3

Kari har vunne 510 000 kr i Lotto. Premien blei utbetalt 1. januar 2002.

- a) Kari plasserte umiddelbart heile premien til 7% rente per år. Kva vil verdien av premien vere høvesvis 2 år og 4 år etter innskotet ?
Kor lenge må premien stå urørt for at verdien skal vere dobla ?
Kor mykje kunne Kari ha brukt av beløpet umiddelbart då ho fikk premien, og likevel ha hatt 510 000 kr tilgjengeleg att om 3 år så sant resten av premiebeløpet blei plassert til 7% årleg rente ?
- b) Kari bestemte seg for å "leve på premien" nokre år ved å setje premieutbetalinga rett i banken og så ta ut like store beløp ved utgangen av kvart år i 6 år framover. Første utbetaling skal skje 31.12.02.
Kor mykje kan ho slik ta ut kvart år framover så sant den årlege renta er på 7% ?
Om Kari heller hadde vald å ta ut 150 000 kr ved utgangen av kvart år framover, kor lenge hadde da den opprinnelege premien halde med same årlege rente ?

Oppgave 4


Funksjonen h er gitt ved at: $h(x, y) = (y - x + 1)(y + 1) = y^2 + 2y - xy - x + 1$

- a) Finn dei partielle deriverte av 1. og 2. orden for h . Vis at h har nøyaktig eitt stasjonært punkt: $(0, -1)$, og klassifiser dette punktet.
- b) A er området i xy -planet som er avgrensa av trekanten med hjørne i $(0, -1)$, $(1, 0)$ og $(1, -1)$. Sidekantane er med i A . Finn minimumspunktet for h over området A .
- c) Vi definerer ein ny funksjon g ved at:

$$g(x, y) = \ln(h(x, y)) = \ln((y - x + 1)(y + 1))$$

Skisser definisjonsområdet til g i xy -planet. Avgjer om g har stasjonære punkt.

Oppgave 5



Utanfor ein låve skal det ved hjelp av eit nettinggjerde på 360 m lagast ei innhengning av 3 like store rektangelforma båsar, sjå figuren til venstre.

Nettingen skal brukast både i ytterkant av innhengninga og til skille mellom båsane. Det skal ikkje vere netting på sidekantane mot låveveggen.

Bestem lengdene på sidekantane x og y slik at arealet av kvar "bås" blir størst mogleg.



Høgskolen i Telemark

Institutt for informatikk og matematiske fag

FORMELSAMLING

**TIL BRUK VED
EKSAMEN
I**

(003) MATEMATIKK

2001 / 2002

UTARBEIDET AV PER CHR. HAGEN OG ROY M. ISTAD

Andregradslikning $ax^2 + bx + c = 0$ der $a \neq 0$

Løsninger: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, såsant $b^2 - 4ac \geq 0$

Sirkellikning $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

Sirkel med radius r og sentrum i punktet (a, b) .

Derivasjon $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Potensregelen: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n x^{n-1}$, uansett n

Derivasjonsregler for funksjonskombinasjoner:

$$a) \quad f = k \cdot u \quad \Rightarrow \quad f' = k \cdot u' \quad (k \text{ er en konstant})$$

$$b) \quad f = u + v \quad \Rightarrow \quad f' = u' + v'$$

$$c) \quad f = u - v \quad \Rightarrow \quad f' = u' - v'$$

$$d) \quad f = u \cdot v \quad \Rightarrow \quad f' = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$e) \quad f = \frac{u}{v} \quad \Rightarrow \quad f' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

Her er f, u og v alle funksjoner av samme variabel.

Kjerneregelen: Hvis $y = f(x) = g(u)$, der $u = u(x)$

så er $f'(x) = g'(u) \cdot u'(x)$

eventuelt $f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

Tangentlikning $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$, der (x_1, y_1) er tangeringspunkt.

Tilvekstformelen $f(a + \Delta x) \approx f(a) + f'(a) \Delta x$, Δx er liten.

Elastisitet Til $y = f(x)$ defineres elastisiteten E i y mhp. x som

$$E = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}$$

Vi har at $\frac{\Delta y}{y} \approx E \cdot \frac{\Delta x}{x}$ når Δx er liten.

Potenser

Definisjoner: $a^0 = 1$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Regneregler: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Eksponensialfunksjoner

Generelt grunntall $a > 0$: $f(x) = a^x \Rightarrow f'(x) = \ln a \cdot a^x$

Grunntall e : $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.71828\dots$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

Kjerneregel: $f(x) = e^{u(x)} \Rightarrow f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x)$

Logaritmefunksjoner

Definisjon av naturlig logaritme (grunntall e):

$y = \ln x$ er det tall som e må opphøyes i for å gi x , dvs.

$$e^y = e^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

Derivert: $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$

Kjerneregel: $f(x) = \ln u(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x)$

Regneregler for logaritmer:

$$\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$$

$$\ln(x^p) = p \cdot \ln x \quad \ln(e^x) = x$$

Definisjon av logaritme med grunntall a , der $a > 0$, $a \neq 1$:

$y = \log_a x$ er det tall som a må opphøyes i for å gi x , dvs.

$$a^y = a^{\log_a x} = x \quad (x > 0).$$

Omregningsregel for logaritmer: $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$

Integralregning

Ubestemt integral: $\int f(x) dx = F(x) + C$, der $F'(x) = f(x)$

Regneregler: $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1} + C$, $n \neq -1$

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, \quad x > 0$$

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} \cdot e^{kx} + C, \quad k \neq 0$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

Bestemt integral:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = \left| F(x) \right|_a^b = F(b) - F(a), \quad \text{der } F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad \text{der } a \leq c \leq b$$

Rekker / Finansmatematikk

Summen av en geometrisk rekke (n ledd):

$$S_n = a + ak + ak^2 + ak^3 + \dots + ak^{n-1} = a \cdot \frac{1 - k^n}{1 - k}$$

Når $|k| < 1$, så vil $S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S = a \cdot \frac{1}{1 - k} = \frac{a}{1 - k}$

- Sluttverdi av beløp K_0 etter n perioder til rente r (pr. periode):

$$K_n = K_0 (1 + r)^n$$

- Nåverdi av et beløp K_n utbetalt etter n perioder til rente r (pr. periode):

$$K_0 = \frac{K_n}{(1 + r)^n}$$

- Oppsparingsannuitet, innbetaling ved utgangen av hver periode. Verdi umiddelbart etter siste innbetaling :

$$V = K \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$$

V = verdi
 K = sparebeløp
 r = rente pr. periode
 n = antall perioder

- Nåverdi av annuitet. Fast utbetaling ved utgangen av hver periode, første utbetaling ved utgangen av første periode:

$$K_0 = K \frac{(1 + r)^n - 1}{r(1 + r)^n}$$

K_0 = nåverdi
 K = utbetalt beløp
 r = rente pr. periode
 n = antall perioder

- Nedbetaling av lån (annuitet). Fast innbetaling ved utgangen av hver periode, første innbetaling en periode etter låneopptak:

$$K = K_0 \frac{r(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

K_0 = lånebeløp
 K = nedbetalingsbeløp
 r = rente pr. periode
 n = antall perioder

Funksjoner av to variabler

Funksjonen $z = f(x, y)$ beskriver en flate i rommet.

Punkt der $\frac{\partial f}{\partial x} = f'_x = 0$ og $\frac{\partial f}{\partial y} = f'_y = 0$ kalles *stasjonære punkt*.

Klassifisering av et stasjonært punkt (a, b)

Vi definerer:

$$A = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(a,b)} = f''_{xx}(a, b) \qquad B = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(a,b)} = f''_{xy}(a, b)$$
$$C = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{(a,b)} = f''_{yy}(a, b)$$

og setter $\Delta = A \cdot C - B^2$

Da gjelder en av følgende muligheter

1. $\Delta > 0$ og $A < 0 \Rightarrow f$ har lokalt maksimum i (a, b)
2. $\Delta > 0$ og $A > 0 \Rightarrow f$ har lokalt minimum i (a, b)
3. $\Delta < 0 \Rightarrow f$ har sadelpunkt i (a, b)
4. $\Delta = 0 \Rightarrow$ Ingen avgjørelse for (a, b)