



Høgskolen i Telemark

EKSAMEN

07. 05. 2004

(862) I T - MATEMATIKK

Tid: 5 timer, 09⁰⁰ – 14⁰⁰

Sidetall: 3

Hjelpemiddel: Kalkulator og formelark

Oppgave 1

- a) Finn siffersekvensen for verdiene

$s = 2A3B_{16}$ uttrykt i 10-tallsystemet,

$t = 315_{10}$ uttrykt i 4-tallsystemet,

$u = 1010101.1101_2$ uttrykt i 8-tallsystemet.

- b) Heltall blir lagret i $n = 10$ bit, med en fortegnsgbit og 2-er komplementmetode. Uttrykk i 10-tallsystemet de to heltallene som er gitt ved lagringskodene:

$u = \text{"00 0011 0011"}$ og $v = \text{"11 0110 1111"}$


Desimaltall blir lagret i $n = 1 + k + p = 1 + 4 + 5 = 10$ bit.

Kommaforskyvningen e i flyttalsformatet blir kodet som $q = e + 2^{k-1}$.

Sett opp lagringskoden til det største mulige positive desimaltallet, og finn verdien av dette uttrykt i 10-tallsystemet.

Oppgave 2

- a) Sett $p = 0$ og $q = 1$, og finn verdien v og utgangsverdien u i kretsen :



Hvilket logisk uttrykk er representert i denne kretsen? Bruk omformingsreglene for logiske uttrykk til å vise at kretsen ovenfor kan erstattes av en ny krets med bare to logiske porter, og skisser denne nye kretsen.

- b) Bruk først en sannhetsverditabell til å avgjøre om uttrykkene er logisk ekvivalente:

$$1) \quad (\bar{p} \wedge q) \vee \bar{q} \qquad 2) \quad \overline{p \wedge q}$$

Bruk deretter omformingsreglene til å avgjøre om uttrykkene er logisk ekvivalente.

Oppgave 3

- a) Bruk Venn-diagram til å avgjøre om uttrykkene har samme resultatmengde :

$$1) \quad ((A \cap B) \cap \bar{C}) \cup ((A \cup B) \cap C) \qquad \text{og} \qquad 2) \quad ((A \cup C) \cap B) \cup (A \cap C)$$

La universalmengden Ω og de tre mengdene A , B og C , være gitt som:

$$\begin{aligned} \Omega &= \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \} \\ A &= \{ 2, 3, 4, 5 \}, \quad B = \{ 1, 2, 3 \} \quad \text{og} \quad C = \{ 1 \} \end{aligned}$$

Bestem resultatmengdene for begge uttrykkene 1) og 2) i dette tilfellet.

- b) Ei gruppe består av totalt 85 studenter som enten er trøtte om morgenen (T), spiser egensmurt lunsjpakke (L) eller kjøper kaffe (K) i kantina til lunsj.

Det er 51 som spiser egensmurt lunsjpakke. 53 av studentene kjøper kaffe til lunsj i kantina. 10 av studentene som er trøtte om morgenen smører ikke lunsjpakke og kjøper ikke kaffe til lunsj i kantina. Det er 3 studenter som er trøtte om morgenen og spiser egensmurt lunsjpakke uten å kjøpe kaffe i kantina. Av de 23 studentene som ikke er trøtte om morgenen, er det 4 som kjøper kaffe i kantina til lunsj uten å ha med seg egen matpakke.

Formuler opplysningene i oppgaveteksten som kardinaltall til mengder.

Hvor mange av dem som er trøtte om morgenen spiser egensmurt lunsjpakke og drikker kaffe de har kjøpt i kantina til lunsj ?

Oppgave 4

- a) Bestem verdien av den aritmetiske rekka: $4 + 19 + 34 + 49 + \dots + 619 + 634$.

- b) Gitt differenslikningen: $3a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$ når $a_0 = 1$ og $a_1 = 3$.
Regn ut a_2 og a_3 , og løs differenslikningen med de gitte startverdiene.

- c) Bryggeriene kjører totalt ut 10 000 flasker hver uke, mens de får 40% av flaskene som til en hver tid er ute på markedet i retur. Vi starter å observere flaskeantallet i uke nr. 1, der det etter utkjøring er $u_1 = 15000$ flasker ute på markedet.

Regn ut hvor mange flasker det er på markedet i de tre neste ukene.

Sett opp en differenslikning i u_n som viser antall flasker ute på markedet i uke nr n og vis at denne har løsningen

$$u_n = 25000 - 10000 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1}$$

Hvor mange flasker er det på markedet 15 uker etter observasjonsstart ?

Oppgave 5

Gitt funksjonen f som: $f(x) = \frac{9}{4}x^2 + 3x$

- a) Regn ut funksjonsverdiene for x -verdiene: $-2, -1, 0, 1$.
Bestem nullpunktene for funksjonen.
Avgjør hvor grafen til f er voksende og hvor den er avtagende.
Finn koordinatene til eventuelle ekstrepunkt på grafen.
- b) Skisser det utsnittet av grafen til funksjonen f der $-2 \leq x \leq 1$.
Bruk 2 cm som enhet på x -aksen, og 4 cm som enhet på y -aksen.
Løs likningen $f(x) = -1$.
Bestem *antall løsninger* av likningen $f(x) = -2$ bare ved å lese av fra grafskissen.